

تايلودين

بودرة قابلة للذوبان في الماء

التركيب: كل غم يحتوي على:-

001	ملغم	تايلوزين (تايلوزين تارتريت)
200	ملغم	دوكسي سايكلين هيدروكلورايد

الخواص:

- التركيبة المشتركة بين الصادين الحيويين تايلوزين و دوكسي سايكلين تعطي فعالية أكبر للمستحضر.
- يتميز التايلوزين بفاعليته الشديدة ضد الأمراض التنفسية.
- الدوكسي سايكلين نظراً لسرعة امتصاصه وبطء إطراره يصبح أكثر فعالية ينتمي إلى مجموعة التتراسيكلين، والتي لها فعالية ضد العديد من البكتيريا إيجابية الجرام وسالبة الجرام مثل المكورات العنقودية، المستدمية الإنفلونزا، كولا، الرئوية، عصيات الجمرة الخبيثة، كلوستريديوم الكزازية و أكتينومايسيس، الليستيريا، الحارث النيابة، الأمعائية النيابة، كليبيسيلا، السالمونيلا، الشيغلا، اليرسنيا.
- دوكسي هو أيضا فعال ضد الميكوبلازما والريكتسيا والكلاميديا، بعد اعطائه عن طريق الفم، الدوكسي سايكلين يصل بشكل جيد الى مستويات الدم بسرعة، ويستمر لفترة طويلة. وذلك بسبب النصف عمر الكبير للدوكسي سايكلين.
- ينصح استخدام الدوكسي سايكلين لعلاج التهابات الجهاز التنفسي الجرثومية.
- تايلوزين هو مضاد حيوي ماكروليد ومثبط للنشاط البكتيري وخصوصا البكتيريا إيجابية الجرام ومكورات (المكورات السحائية سلبية الجرام والجونوكوكاي). (وهو فعال ضد البكتيريا التالية: ستافيلوكوكاس، الستريبتوكوكاس والكورائني باكتير، نيسريا، فلافوباكتير، كامبيلوباكتر، باسيلوس، الموراكسيا، المستدمية النيابة، البورديتيلا برونكايتس، اللوليبات (خصوصا اللولبية hyodysenteriae) وإلزام الكائنات اللاهوائية (مثل م. هيوساينوفال م. هيونيمونيا، م. كاريبي(غير حساس مايكوباكتر، النوكارديا النيابة. والفطريات. بعد تناوله عن طريق الفم، وسيتم الوصول إلى مستويات الدم العلاجية ضمن 2-4 ساعات.

الإستطبابات:

- للوقاية ومعالجة أمراض الأجهزة التنفسية والهضمية والبولية التناسلية: المايكوبلازما والرشح المعدي (كورايزا) والكولاي والرشح المزمن والتهاب السرة وكيس الصفار والنزلات المعوية والاسهالات والباستريلا والالتهاب المعوي النخري (الكلوستريديا) والتهاب الأكياس الهوائية والتهاب التجاويف الأنفية والتهاب الأغشية الزلالية للمفاصل والمكورات العنقودية والعقدية والكورائين والهكساميتازيس وزهري الطيور (سبيروكيتا).
- حالات الإجهاد الناتجة عن اللقاحات وقص المناقير والنقل وتغيير بيوت الدواجن والعلف واختلاف الأحوال الجوية.

الجرعات: (لمدة 4- 5 أيام) .

- المعالجة:
- الدواجن : 100 غم لكل 200 لتر من ماء الشرب.
- الحيوانات المختلفة: 0.5 غم / 10 كغم وزن جسم يومياً مع ماء الشرب .
- الوقاية: نصف الجرعة العلاجية ولمدة نفسها.

فترة الأمان: * لاستهلاك اللحوم: 15 يوم. * لاستهلاك البيض: 4 أيام.

تنبيهات:

- أثناء المعالجة ، يجب عدم استعمال البيض للاستهلاك البشري.
- يجب عدم إضافة الأملاح المعدنية إلى ماء الشرب الذي يحتوي على العلاج .

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات: (100، 250، 500، 1000) غم.