

فلونيكسيفاب

محلول للحقن

للحقن بالوريد أو بالعضل في الخيل

للحقن بالوريد في الأبقار

التركيب:

كل مل يحتوي على:

فلونكسين ميجلومين (فلونكسين) 50 ملغم.

الإستطابات:

الخيل : ينصح باستعمال فلونيكسيفاب لتسكين الالتهابات والآلام المصاحبة لأي خلل عضلي (عرج، التهاب مفاصل ... الخ) والمغص المعوي.
الأبقار : ينصح باستعماله لخفض الحرارة في حالات الالتهابات الحادة.

الجرعة:

الخيل :

▪ **ألام العضلات:**

- 1.1 ملغم / كغم من وزن الجسم (1 مل / 45 كغم) مرة واحدة يوميا.
- يمكن حقنهم عضليا أو في الوريد وتعاد لمدة (5 أيام).

▪ **بالنسبة لحالات المغص:**

- 1.1 ملغم / كغم من وزن الجسم حقن في الوريد لتخفيف الألام في الحال، يمكن إعادة العلاج لو ظهرت أعراض المغص مرة ثانية.

الأبقار :

ينصح بحقن 2.2 ملغم / كغم (2 مل / 45 كغم) لخفض الحرارة في حالات الالتهابات الحادة ويفضل الحقن في الوريد بحيث يتم تحديد سبب الالتهاب الحاد وعلاجه بالعلاج المرافق المناسب.

تحذيرات :

لا توجد اي اعراض جانبية لهذا المستحضر إذا استعمل حسب التعليمات ويجب تجنب الحقن في الشريان في الخيول والأبقار. فإذا تم حقن الخيول سهوا في الشريان يمكن أن تظهر رد فعل عكسي.

أعراض مثل التشنجات وضعف في العضلات، لكن هذه الأعراض تكون لحظية وتخفني بدون أي علاج مضاد.

الأحتياطات :

- يجب عدم خلط فلونيكسيفاب مع أي مستحضر آخر في نفس الحقنة.

فترة سحب العلاج :

- الحليب: لا يوجد.
- اللحم: 10 أيام بعد آخر جرعة.

التخزين:

فانجر
الحقن

يحفظ في مكان جاف بدرجة حرارة أقل من 30 ° م.
العبوات: (50، 100) مل.