

# مياودون

## محلول للحقن

**التركيب:** كل مل يحتوي على:

ميلوكسيكام 20 ملغم

**الاستجابات:**

**الأبقار:** يستخدم في التهابات الجهاز التنفسي الحادة مع المضادات الحيوية المناسبة للحد من علامات السريرية في الماشية . ويستخدم في حالات الإصابة بالإسهال مترافقاً مع مركبات معالجة الجفاف للحد من العلامات السريرية عند العجول الاكثر من اسبوع واحد من العمر .

**الخيول:** يستخدم في التخفيف من الإلتهابات و اللآلام في اضطرابات الهيكل العضلي الحادة المزمنة. و التخفيف من الالم الذي يصاحب مغص الخيول

**الجرعات:**

**الابقار:** جرعة واحدة للحقن تحت الجلد أو في الوريد

0.5 ملغم ميلوكسيكام / كغم (2.5 مل / 100 كغم) مترافق مع العلاج بالمضادات الحيوية أو مع مركبات معالجة الجفاف حسب الحاجة.

**الخيول:** جرعة واحدة في الوريد

0.6 ملغم ميلوكسيكام / كغم (3 مل / 100 كغم).

يستخدم ميلودون 15 ملغم / مل عن طريق الفم (كمعلق) لمواصلة العلاج في جرعة 0.6 ملغم ميلوكسيكام / كغم من وزن الجسم بعد 24 ساعة من جرعة الحقن الوريدي.

**موانع الاستعمال:**

• لا تستخدم في الحالات التالية:

- في الخيول التي تبلغ أقل من 6 أسابيع من العمر .
- في الابقار التي تبلغ أقل من أسبوع واحد من العمر لمعالجة حالات الإسهال.
- الفرس الحامل أو المرضعة .
- الحيوانات التي تعاني من إختلال وظائف الكبد، القلب أو الكلى والإضطرابات النزفية، أو عندما يكون هناك دليل على وجود قرحة معدية.
- حالات فرط الحساسية للمادة الفعالة.

**محاذير الاستخدام:**

- **الابقار:** قد يلاحظ عند الحقن، تحتج الجلد أو الحقن العضلي تورم عابر في مكان الحقن ولكن سرعان ما يختفي دون تدخل.
- **الخيول:** من الممكن أن تحدث ردود فعل الحساسية وينبغي التعامل معها بطريقة عرضية.
- الحيوانات التي تعاني من حساسية للعقاقير المضادة للإلتهاب غير الستيرويدية (الأدوية المضادة للإلتهاب).

**فترات السحب:**

**الابقار:** اللحم: 15 يوماً.

الطيب: 5 أيام.

**الخيول:** اللحم: 5 أيام.

**التخزين:**

يحفظ في مكان جاف و بدرجة حرارة أقل من 30 °م.

**العبوات:** (50، 100) مل.