

فابكو

المجموعة:

aryloxyphenoxypropionate

فلوازيفاب-15%

مبيد عشبي مركز قابل للاستحلاب

مبيد عشبي جهازى اختياري يستعمل بعد الانبات، شديد الفاعلية لمكافحة العديد من الاعشاب الحولية والمعمرة رفيعة الأوراق في المحاصيل عريضة الأوراق وحقول الفاكهة.

التركيب : كل لتر يحتوى على :

15.0% و/ح (مادة فعالة)

فلوازيغوب-ب-بيوتيل

الخواص:

- فلوازيغاب-15% : مبيد اختياري ليس له تأثير على المحاصيل عريضة الأوراق
- فلوازيغاب-15% : ذو فعالية عالية في مكافحة الأعشاب النجيلية الحولية والمعمرة.
- فلوازيغاب-15% : مبيد جهازى يمتص سريعاً عن طريق الأوراق وينتقل في جميع اجزاء النبات ليؤثر على مناطق النمو وأجزاء النباتات الأخرى وينتهي بالقضاء على الأعشاب الرفيعة "النجيلية" ويبدأ ظهور التأثير بعد يومين من الرش حيث يتوقف نمو الأعشاب وتصبح غير منافسة للمحصول الأساسي وبعد سبعة أيام تبدأ الأعراض بالظهور على الأوراق حديثة النمو وخلال 3 – 4 أسابيع يتحول لون الأعشاب الى اللون البني أو الأحمر الداكن وتتعفن وتموت.

الاستعمالات:

المحصول	الأعشاب	معدل الاستعمال / 20 لتر	عدد الرشاشات / سنة	فترة إعادة التطبيق	فترة ما قبل الحصاد
المشمش، الكرز، النكتارين، الخوخ.	الأعشاب النجيلية	57 مل	3	21 يوم	14 يوم
الجزر.	رفيعة	57 مل	2	14 يوم	45 يوم
الجريب فروت، الليمون، البرتقال، البوملي، كمكوات، المندرين.	الأوراق (الحوالية والمعمرة) مثل:	57 مل	3	21 يوم	14 يوم
الفاصولياء الجافة.	النجيل، الدنقة، الزوان،	57 مل	2	14 يوم	60 يوم لا يطبق المبيد على اللوبياء.
الخس.	الدفن، ذيل	57 مل	2	14 يوم	14 يوم
البصل.	الثعلب،	57 مل	2	14 يوم	45 يوم
البصل الأخضر.	الشوفان	57 مل	2	14 يوم	14 يوم
محاصيل الفاكهة غير المثمرة: التفاح، الافوكادو، النخيل، التين، الجوافة، المانجا، الزيتون، الأجاص، الرمان.	البري، القصيبي وغيرها.	57 مل	3	14 يوم	لا يطبق المبيد على الأشجار التي سيتم حصادها كغذاء أو علف في غضون سنة واحدة بعد التطبيق.

تحذير:

- لا يستعمل المبيد إلا على المحاصيل الواردة في الملصقة مع مراعاة فترات الأمان.
- يجب إضافة مادة ناشرة ولاصقة لزيادة فعالية المبيد على أن تكون نسبة المادة الفعالة بالمادة الناشرة أعلى من 75%
- يجب استخدام كمية كافية من محلول الرش لضمان التغطية الكاملة للأعشاب المستهدفة. يجب استخدام (4.75 – 38 لتر لكل 1 دونم) من محلول الرش. عند الإصابة الشديدة يجب استخدام ما لا يقل عن 19 لتر لكل 1 دونم لضمان التغطية الكاملة للأعشاب.

موعد التطبيق:

- للحصول على أفضل النتائج، يجب تطبيق المبيد خلال بداية تفرع الأوراق عند ارتفاع 5 سم أثناء ظروف النمو الجيدة. قد يؤدي التطبيق خلال فترات الجفاف الطويلة إلى تقليل الفعالية.
- يجب التأكد من التغطية الشاملة عند الرش لجميع أوراق الأعشاب عند فترة النمو النشط. كما ويجب التطبيق على الأعشاب التي لا تتعرض للإجهاد من الرطوبة أو درجة الحرارة أو انخفاض خصوبة التربة أو الإصابة الميكانيكية أو الكيميائية.
- يمكن الحصول على مكافحة مثلى للأعشاب المعمرة إذا تم تقطيع الرايزومات والسيقان الأفقية من خلال ممارسات الحراثة المسبقة لتحفيز ظهور أكبر قدر من براعم العشب.
- الخلط: املاً خزان الرش بالماء جزئياً وابدأ في التحريك المستمر ثم قم بقياس الكمية المطلوبة من المبيد واسكب المنتج ببطء في خزان الرش ثم أضف باقي الماء أثناء التحريك المستمر.

محاذير تطبيق المبيد:

- لا يطبق المبيد على الأعشاب المجهدة بسبب الرطوبة أو درجة الحرارة أو انخفاض خصوبة التربة أو الإصابة الميكانيكية أو الكيميائية.
- لا يطبق المبيد على الأعشاب التي تم حراستها أو الأعشاب التي شكلت رؤوس البذور أو التي تجاوزت مراحل النمو الأولى.
- لا يستخدم المبيد إذا كان من المتوقع هطول الأمطار خلال ساعة واحدة.
- لا يتم زراعة الذرة الرفيعة والحبوب في غضون 60 يوماً من آخر تطبيق لمبيد الأعشاب فلوازيفاب.
- لا يتم زراعة أية محاصيل أخرى في غضون 30 يوماً من آخر تطبيق لمبيد الأعشاب فلوازيفاب.
- تجنب انجراف المبيد إلى المحاصيل والمناطق غير المستهدفة.

- للحصول على معلومات عن الاسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

قمع نمو الأعشاب:

تتفاعل أنواع مختلفة من العشب بشكل مختلف مع معدلات رش المبيد ولهذا السبب من الضروري التجربة بمعدلات الرش ضمن الحدود الموصى بها. استعمال معدلات الرش الأعلى قد تسبب تأثيراً مؤقتاً بظهور اللون البني وكذلك عند استعمال معدلات الرش الأدنى سينتج عنه تقليل فترة قمع نمو الأعشاب. قد ينتج عن التطبيقات المتكررة للمبيد بزيادة تكاثر الأعشاب عريضة الأوراق العريضة وذلك بسبب المنافسة الأقل مع الأعشاب رفيعة الأوراق.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش:

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور 48 ساعة على آخر معاملة.

قابلية الخلط :

غير قابل للمزج مع معظم المبيدات