

فا بكو

المجموعة:

Neonicotinoid ⁽¹⁾

Avermectin ⁽²⁾

فابكومك فلكس

مبيد حلم وحشري زراعي سام
مركز معلق

مبيد حلم وحشري يتميز باحتوائه على ثياميثوكسام و أبامكتين ذو تأثير جهازى، باللامسة ومعدي لمكافحة الحلم والحشرات الثاقبة والماصة على المحاصيل الواردة في جدول الاستعمال.

التركيب : كل لتر يحتوى على :

15.2 % و/ح (مادة فعالة)
3.3 % و/ح (مادة فعالة)

ثياميثوكسام ⁽¹⁾
أبامكتين ⁽²⁾

الخواص:

فابكومك فلكس : مبيد حلم وحشري ذو تأثير جهازى، معدي وباللامسة.
فابكومك فلكس : يحتوى على ثياميثوكسام والأبامكتين لمكافحة الحلم والحشرات الثاقبة والماصة

الاستعمالات:

المحصول	الأفة	معدل الاستعمال مل/20 لتر ماء	ملاحظات الاستعمال	فترة الامان (يوم)
الحمضيات (ليمون، برتقال، مندرينا، بوملي، كمكوات، جريب فروت)	المن الحشرات القشرية الحلم العريض ذبابة الحمضيات السوداء صانعات الأنفاق حلم صدأ الحمضيات التربس ذبابة ثمار الفاكهة نطاطات الاوراق البق الدقيقي الحلم ذو النقطتين الذبابة البيضاء	12-8	- لا يستخدم على الأشتال. - لا يستخدم قبل وخلال مرحلة الازهار وخصوصا عند تواجد النحل - يكرر رش فابكومك فلكس او اي من المبيدات التي تحتوي على أبامكتن بعد 30 يوم على الاقل. (يكرر الرش 3 مرات خلال السنة كحد أقصى) - يعاد رش اي من المبيدات التي تحتوي على ثياميثوكسام بعد 7 ايام على الأقل	7
البطاطا البطاطا الحلوة الخرشوف الزنجبيل	الخنافس البرغوثية/ (الطور البالغ) صانعات الانفاق نطاطات الأوراق الحلم	7	- يبدأ الرش عند ظهور الأفة - يكرر الرش بعد 7 ايام على الأقل . (يكرر الرش مرتان كحد أقصى)	14

تحذير:

- لا يستعمل المبيد إلا على المحاصيل الواردة في الملصقة مع مراعاة فترات الأمان أثناء عملية القطف.	- يمنع الرش خلال مرحلة ما قبل الازهار أو عند الازهار في الحمضيات وخاصة عند تواجد النحل.
- توضع المناحل في الحقول بعد 5 ايام اعلى الاقل من اخر معاملة	- يجب رش فابكومك فلكس بعد غروب الشمس وعندما تكون درجات الحرارة اقل من 12 مئوي.
- يمنع استخدام فابكومك فلكس في أنظمة الري.	- يمنع رعي الحيوانات في المناطق المعاملة منعاً باتاً .

- في البطاطا، البطاطا الحلوة، الخرشوف والزنجبيل يكرر الرش بعد 7 ايام على الأقل (مرتان كحد أقصى خلال الموسم).

في الحمضيات يكرر رش فابكومك فلكس او اي من المبيدات التي تحتوي على أباتكتن بعد 30 يوم على الاقل (يكرر الرش 3 مرات خلال السنة كحد أقصى) اما المبيدات التي تحتوي على ثياميثوكسام يكرر الرش بعد 7 ايام على الأقل

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش :

يمنع دخول الحقل المعامل قبل مرور 4 أيام من آخر معاملة.

الأثر الضار على النبات:

لا يسبب اي ضرر عند اتباع التعليمات الموجوده على الملصق.

فترة تحريم الرعي للحيوانات:

يمنع رعي الحيوانات في المناطق المعاملة منعا باتا