

# برومكسان - بلص

محلول للشرب

التركيب : يحتوي كل مل على:

20 ملغم	برومكسين هيدروكلورايد
10 ملغم	زيت يوكالبيتوس
10 ملغم	زيت الحمضيات
10 ملغم	ثايمول
10 ملغم	كافور

## الاستطبابات:

- يعطى كمادة مقشعة تعمل على إذابة وتسييل وتقليل لزوجة وكثافة الإفرازات المخاطية .
- تعطي المواد الأخرى (زيت اليوكالبيتوس، وزيت الحمضيات والثايمول والكافور) تأثيراً متميزاً لتلطيف آثار الإصابة بالأمراض الفيروسية في الدواجن (نيوكاسل، انفلونزا الطيور، التهاب الشعب الهوائية، المايكوبلازما (الرشح المزمن)).
- حالات الإنهاك الناتجة عن تفاعلات التطعيم الوقائية.
- تحسين الشهية لدى قطعان الدواجن المصابة بالأمراض.
- التهاب الشعب الهوائية والالتهاب القصي الرئوي في الأبقار والضأن والماعز والخيول.



# VAPCO

**VETERINARY & AGRICULTURAL  
PRODUCTS MANUFACTURING CO. LTD.**



## تنبيه:

- آمن للاستعمال عند إعطائه مع المضادات البكتيرية.
- يلطف من الآثار السيئة للجو الحار على جسم الحيوانات وتخفيف حالات الإنهاك الحراري لديها من خلال عمله كمحفز للجهاز التنفسي ومن ثم تحسين عملية التبادل الحراري للجسم.

## الجرعات :

- الدواجن: (0.5 مل لكل 4 لترات) من ماء الشرب لمدة (3-5) أيام.
- الأبقار والضأن والماعز: (1 مل لكل 40 كغم وزن الجسم) لمدة (5-7) أيام.
- الخيول: (0.5-1.25 مل/ لكل 100 كغم وزن الجسم) لمدة (5-7) أيام.

## فترة سحب العلاج :

- الأبقار والضأن والماعز: يوم واحد.
- الدواجن: 8 ساعات.

## التخزين:

يُحفظ في مكان بعيد عن الضوء، وبدرجة حرارة أقل من 30°م.

## العبوات:

(100، 250، 500، 1000) مل.

**للاستعمال البيطري فقط**