

فابكو

المجموعة :

Oxime Carbamate

أجرنيت - ٢٥٪

مبيد حشري زراعي سام جداً
مسحوق قابل للذوبان في الماء



مبيد حشري جهازي للقضاء على الآفات الحشرية التي تصيب المحاصيل الزراعية.

التركيب : كل كغم يحتوي على :

٢٥ ٪ و/و (مادة فعالة)

ميثوميل

الخواص :

- أجرنيت - ٢٥٪ : معبأ في أكياس قابلة للذوبان في الماء .
أجرنيت - ٢٥٪ : مبيد صاعق سريع وقاتل لاعداد كبيرة من الحشرات.
أجرنيت - ٢٥٪ : فتاك يقاوم الحشرات في جميع أطوارها مثل البيوض واليرقات.
أجرنيت - ٢٥٪ : يمتاز بسرعة تحلله في الطبيعة مما يقلل فترة الأمان المطلوبة على الخضروات و أشجار الفاكهة.
أجرنيت - ٢٥٪ : ليس له اثر سلبي على البيئة لسرعة تحلله.
أجرنيت - ٢٥٪ : يحتوي على مادة مقينه، ولونه الأزرق يجعله مميذا عن بقية المواد.

الاستعمالات :

المحصول	الآفة	نسبة الاستعمال	فترة الامان (أيام)
البندورة.	ديدان الأوراق والثمار.	٢-٤ كيس / برميل	٧
الملفوف، الزهرة.	الديدان الخضراء، ديدان الأوراق، المن، التريس.	٢-٤ كيس / برميل	٧
الخيار، الكوسا، البطيخ، الفاصولياء، الملوخية، الفلفل، الباذنجان، البطاطا.	ديدان الأوراق، المن ، التريس.	٤ كيس / برميل	٧
الذرة .	الديدان القارضة ، حفار الذرة، المن ، الخنافس .	٤ كيس / برميل	٧
التفاح، الاجاص، الدراق، المشمش، الكرز، اللوز، الحمضيات.	المن الأخضر والأسود، صانعات الأنفاق، حفار الساق، البسيلا، نفايات الأوراق، التريس، النطاطات.	٤ كيس / برميل	١٤
العنب .	ديدان العنقود، نطاطات الأوراق.	٤ كيس / برميل	٧
نباتات الزينة (الحقول المفتوحة ، البيوت البلاستيكية).	نفايات الأوراق، صانعات الأنفاق، البق، ديدان الأوراق، نطاط الأوراق، المن ، التريس .	٤ كيس / برميل	--

برميل = ٢٠٠ لتر ماء

الكيس = ١٠٠ غم أجرنيت - ٢٥٪

فابكو

تذير :

عدم استعمال المبيد على المحاصيل غير الواردة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.

فترة تعريم دخول الحقل المرشوش :

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٧٢ ساعة على آخر معاملة رش.

إرشادات :

- يجب استعمال مرشات أرضية ذات ضغط منخفض أثناء الرش ويستعمل اجرنيت-٢٥% في المزارع التجارية ولا يفضل استعماله في الحدائق المنزلية.
- املاً خزان الرش حتى ربعه أو نصفه بالماء ثم أضف الكمية الموصى بها من اجرنيت-٢٥% وابدأ بالتحريك (استعمل طرقا ميكانيكية) ثم أكمل تعبئة الخزان حتى نهايته ومن ثم ابدأ الرش.
- استعمال النسب الموصى بها عند بدء ظهور الحشرات واكمل الرش على فترات تمتد ٥ - ٧ أيام حسب الحاجة.
- في حالة وجود اكثر من نسبة استعمال المنخفضة على النباتات في أطوار نموها الأولى وعندما تكون الإصابات الحشرية خفيفة.

قابلية الخلط :

قابل للخلط مع معظم المبيدات الحشرية والفطرية المعروفة وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش.