



فابك

المجموعة:

Triazole

أديفون -٪٢٥

مبيد فطري زراعي سام / مسحوق قابل للبلل

مبيد فطري جهازي يستعمل لمكافحة البياض الدقيقي والأصداء وتبعق الأوراق وتلطخ الأوراق والعنف الأسود على المحاصيل الواردة في جدول الاستعمالات.

التركيب: كل كغم يحتوي على:

٪٢٥ و/و (مادة فعالة)

تراياديسيفينون

الخصائص:

أديفون -٪٢٥: مبيد فطري جهازي وقائي وعالجي كما أن له تأثير ابادي، يمتص عن طريق الأوراق والجذور وينتقل بسرعة عن طريق الأنسجة الغضة.

أديفون -٪٢٥: يستعمل لمكافحة العديد من الأمراض الفطرية مثل البياض الدقيقي، الأصداء، تبعق الأوراق، على مدى واسع من المحاصيل الزراعية.

أديفون -٪٢٥: مبيد خفيف السمية للثدييات.

الاستعمالات:

الفترة الآمنة (أيام)	موعد ومعدل الاستعمال	المرض	المحصول
٢٨	٥٠٠ غم / هكتار تعاد عملية الرش عند ظهور أعراض الإصابة مجددا	البياض الدقيقي، الأصداء، تلطخ الأوراق، تبعق الأوراق.	الحبوب
١٤	١٥٠ - ٢٠٠ غم / هكتار	العنف الأسود، البياض الدقيقي.	العنب
١٤	٤٠٠ غم / هكتار	البياض الدقيقي.	البازنجان، الخيار، البصل، اللفت
١٤	٢٠٠ - ٣٠٠ غم / هكتار	البياض الدقيقي.	البازلاء
١٤	٤٠٠ - ٥٠٠ غم / هكتار	البياض الدقيقي.	البنودرة، الفلفل، الخرسوف
١٤	٤٠٠ غم / هكتار	الأصداء.	الفاوصلياء
١٤	٥٠٠ غم / هكتار	البياض الدقيقي، الأصداء.	الشمندر السكري
١٤	١٠ - ٢٠ غم / لتر ماء رش وقائي كل ٧ - ١٤ يوم	البياض الدقيقي.	التبغ
٣ - ٤ أسابيع	١ - ٠٠٥ كغم / هكتار رش وقائي أو عند ظهور الأعراض الأولى للمرض ٢ - ١ كغم / هكتار في حالة الاصابة الشديدة يعاد الرش بعد ٣ - ٤ أسابيع	الأصداء.	القهوة

هكتار = ١٠٠٠٠ م²

* للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

فابك

تحذير : عدم استخدام المبيد إلا على المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش :
يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على آخر معاملة رش.

قابلية الخلط :

قابل للخلط مع معظم المبيدات وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش ويفضل استعمال مزيج الرش بعد خلطه مباشرة.