

فابكو

المجموعة:

Phenoxyacetic acid

استرديفور - ٦٢٪

مبيد عشبي زراعي سام
مركز قابل للإستحلاب



مبيد عشبي جهازي انتقائي لمكافحة الأعشاب الحولية عريضة الأوراق والاعشاب المعمرة في حقول القمح.

التركيب: كل لتر يحتوي على :

٦٢٪ دايزواوكتيل استر

و ح (مادة فعالة)

الخواص:

استرديفور - ٦٢٪: مبيد عشبي جهازي انتقائي، لمكافحة الأعشاب الضارة الحولية عريضة الأوراق والاعشاب المعمرة في حقول القمح عن طريق سريانه داخل الاعشاب.

استرديفور - ٦٪: يتميز هذا المبيد بأنه لا يتاخر بسرعة مما يجعل ضرره بالنباتات الحساسة مثل البطاطا والقطن والبنادورة قليلة جداً أو معدومة.

استرديفور - ٦٪: يتحلل في التربة بعد فترة قليلة من رشه مما يجعل إمكانية تجمعيه وتكلته من سنة لأخرى في التربة معدومة.

استرديفور - ٦٪: غير ضار للحربوب إذا استعمل بالنسبة الموصى

الاستعمالات:

يستعمل بشكل خاص لمكافحة الأعشاب الحولية والمعمرة عريضة الأوراق في حقول القمح.

المحصول	الأعشاب	معدل الاستعمال	موعد الاستعمال
القمح.	الاعشاب عريضة الأوراق الحولية والمعمرة مثل: مدادة، عليق، قزازة، هندباء، شبيط، حشيش الجبل،	١٣٧ - ٥٦ مل / دونم	يستعمل لرش حقول القمح في فصل الربيع في مرحلة التقريخ (الاشطاء) وقبل مرحلة تكوين السنابل (التعقيد، التطبين) يتاثر الإنتاج بشدة إذا رش المبيد في طور مبكر أو في طور متاخر.
عند تأسيس المراعي.	الرمرام، قريض، سعيدة، فس الكلاب، جعاضيس.	٢,٤ - ١,٦ لتر / دونم	يستخدم عند ظهور الاعشاب فقط دونم = ٢م

تحذير:

- عدم استخدام المبيد إلا على المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمالات.

- قد يسبب ضرر لبعض المحاصيل مثل أشجار الفاكهة والعنبر والخضار والأزهار في حال وصول رذاذ المبيد إليها.

فترة تعريم دخول الحقل المرشوش:

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٤٨ ساعة على آخر معاملة رش.

فترة تعريم الرعي للحيوانات:

يمتنع دخول الحقل المرشوش لحيوانات الرعي لمدة لا تقل عن ٧ أيام على آخر معاملة رش.

* للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

فابك

ارشادات :

- يجب معايرة آلة الرش قبل الاستعمال.
- يوصى باستعمال التركيز الأقل للأعشاب الحولية.
- يوصى باستعمال التركيز الأعلى للأعشاب المعمرة.
- يفضل الرش عندما تكون درجة حرارة الجو ما بين ٣٢-٧ م°.
- تجنب وصول رذاذ المبيد للأشجار والمزروعات الملاصقة للحقول المزروعة.
- يوصى باستعمال مضخة خاصة لرش المبيد وإذا تعذر ذلك فيجب غسل المضخة جيدا قبل استعمالها مرة أخرى.
- استعمال المعدلات العالية تؤدي إلى ظهور أعراض التسمم على المحصول في أغلب الأحيان.

قابلية الخلط :

غير قابل للخلط مع غيره من المبيدات الأخرى.

* للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.