

فابكو

المجموعة:

Nitroguanidine

إل-تورو ٢٥٪



مبيد حشري زراعي سام
مركز معلق

مبيد حشري ذو جهازية عالية له تأثير معوي على الحشرات ويعمل بالملامسة للقضاء على الحشرات الماصة والقارضة على مدى واسع من المحاصيل الزراعية الواردة في الجدول.

التركيب: كل لتر يحتوي على :

٢٥٪ و/ ح (مادة فعالة)

ثياميثوكسام

الخواص:

إل- تورو ٢٥٪: مبيد حشري جهازى ذو فعالية عالية وله تأثير معوي ويعمل بالملامسة.

إل- تورو ٢٥٪: يمتاز بنسب الإستخدام المنخفضة وفعاليتيه الشديدة التي تدوم طويلاً.

إل- تورو ٢٥٪: تركيبته المميزة والمتمثلة في التأثير على وظائف الجهاز العصبي تعمل على شل حركة الحشرات وبالتالي موتها.

الاستعمالات:

المحصول	الآفة	معدل الاستعمال ٢٠ / لتر ماء	فترة الأمان (أيام)
الشعير	المن	٦ مل	٢١
الفراولة	المن، نطاطات الأوراق	٢ - ٤ مل	٣
	البق، سوسة الفاكهة	٦ مل	
العنب	الخنافس، نطاطات الأوراق، البق الدقيقي	٢ - ٥ مل	٥
الملفوف، الزهرة	المن، الخنافس	٢ - ٤ مل	٧
	التربس، الذبابة البيضاء	٤ - ٨ مل	
الليمون، البرتقال، البوملي، المندرين، الجريب فروت	المن، نطاطات الأوراق	٤ - ٦ مل	١٤
	البسبلة، ذبابة الحمضيات، نافقات الأوراق، البق الدقيقي، الحشرات القشرية، الذبابة البيضاء	٦ - ٨ مل	
	السوس، الحفار، ذبابة الفاكهة، بق الثبات، التربس.	٧ - ٨ مل	
الخيار، الشمام، اليقطين، الكوسا، البطيخ	المن	٢ - ٤ مل	٧
	الخنافس، نافقات الأوراق، الذبابة البيضاء.	٤ - ٨ مل	
البادنجان، الفلفل، البندورة	المن، نطاطات الأوراق	٣ - ٤ مل	٧
	الذبابة البيضاء، السوس، البق	٤ - ٨ مل	
الخس، الكرفس، البقدونس، السبانخ	المن، الخنافس، نطاطات الأوراق	٢ - ٤ مل	٧
	الذبابة البيضاء	٤ - ٨ مل	
التنوع	المن، نطاطات الأوراق، الخنافس	٢ - ٤ مل	٧

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

فابكو

المحصول	الأفة	معدل الاستعمال ٢٠ / لتر ماء	فترة الأمان (أيام)
الأجاص، التفاح، الأسكدنيا، السفرجل	(بعد الإزهار): نطاط الأوراق	٣ - ٤ مل	١٤
الفجل	المن، الخنافس، نطاطات الأوراق	٢ - ٤ مل	٧
	الذبابة البيضاء	٤ - ٦ مل	
الجزر، الشمندر، اللفت	المن، الخنافس، نطاطات الأوراق	٢ - ٤ مل	٧
	الذبابة البيضاء	٤ - ٦ مل	
المشمش، الخوخ، النكتارين، الدراق	نطاطات الأوراق	٣ - ٤ مل	١٤
	المن	٤ - ٦ مل	
	ذبابة الفاكهة، البق، التريبس	٧ - ٨ مل	
البطاطا، البطاطا الحلوة	المن	٤ مل	١٤

تحذير:

- لا يستعمل المبيد على المحاصيل غير الواردة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.
- عدم رش المبيد خلال فترة الإزهار.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش:

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على آخر معاملة رش.

قابلية الخلط:

قابل للخلط مع معظم المبيدات ولكن غير قابل للخلط مع المواد عالية القلوية والمؤكسدة وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش.