

فابكو

الجموعة :
Avermectin

ايمافاب - ٢٪

مبيد حشري زراعي سام
مركز قابل للاستحلاب



مبيد حشري غير جهازي يعمل على اختراق انسجة النبات ويعمل على شل حركة حشرات حرشية الاجنحة ويوقفها عن التغذية بعد ساعات ويمكن ملاحظة موتها بعد ٢-٤ ايام.

التركيب: كل لتر يحتوي على :

٢٪ و/ح (مادة فعالة)

ايماميكيتين بنزويت

الخواص :

ايمافاب - ٢٪ : مبيد حشري غير جهازي يقضي على الديدان والعث بكافة انواعها التي تصيب العديد من المحاصيل الزراعية وخصوصا تلك التي اكتسبت مناعة ضد المبيدات التقليدية الحشرية الاخرى.
ايمافاب - ٢٪ : عند رشه على المزروعات فانه ينفذ داخل انسجة النبات مما يؤدي الى اثر متبقي فعال وقاتل طويل الامد ضد الحشرات.
ايمافاب - ٢٪ : ليس له تاثيرات ضارة على النباتات.

الاستعمالات :

المحصول	الآفة	معدل الاستعمال ٢٠/ لتر ماء	توصيات	فترة الأمان (أيام)
الملفوف، البروكلي، الزهرة.	ديدان الشمندر القارضة، عثة الظهر الماسي، دودة الملفوف. لثافات اوراق الملفوف، صانعات الأنفاق.	٨,٥ - ٤,٢٥ مل ٨,٥ - ٥,٦ مل	تتم المعاملة عند الظهور الاولي لليرقات، ويتم تكرار الرش للمحافظة على افضل النتائج.	١٤
الخس، الكرفس، السبانخ.	ديدان الشمندر القارضة، ديدان براعم التبغ. لثافات اوراق الملفوف، صانعات الأنفاق.	٨,٥ - ٤,٢٥ مل ٨,٥ - ٥,٦ مل		٧
الباذنجان، الفاصل، البندورة.	ديدان الشمندر القارضة، لثافات اوراق الملفوف، ديدان براعم التبغ، دودة ثمار البندورة. لثافات الفصّة، صانعات الأنفاق.	٨,٥ - ٤,٢٥ مل ٨,٥ - ٥,٦ مل		٧
التفاح، الاجاص، السفرجل.	ديدان البراعم، صانعات الأنفاق، لثافات الاوراق، الحلم.	٨,٥ - ٤,٢٥ مل		١٤

تحذير :

عدم استعمال المبيد على المحاصيل غير الواردة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش : يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٤٨ ساعة على آخر معاملة رش.

قابلية الخطأ :

قابل للخلط مع معظم المبيدات الحشرية والفطرية والأسمدة الورقية وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش.

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.