

فابكو

المجموعة:

Triazole

بروفيفاب - ٢٥٪



مبيد فطري زراعي سام / مركز قابل للاستحلاب

مبيد فطري جهازى علاجي ووقائي يستعمل لمكافحة العديد من الأمراض الفطرية وذلك على المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمالات.

التركيب : كل لتر يحتوي على :

٢٥٪ و/ح (مادة فعالة)

بروبيكونازول

الخواص :

بروفيفاب - ٢٥٪ : مبيد فطري جهازى علاجي ووقائي.

بروفيفاب - ٢٥٪ : مبيد ذو فعالية يعمل عن طريق الأوراق لمكافحة الأمراض الفطرية على المحاصيل الواردة في جدول الاستعمالات.

الاستعمالات :

المحصول	المرض	معدل الاستعمال / ٢٠ لتر ماء	التوصيات	فترة الأمان (أيام)
الشعير	البياض الدقيقي، اللطخات	٣ - ١٠ مل	يرش عند ظهور الإصابة وتستخدم الجرعة العليا في حالة الإصابة الشديدة و يعاد الرش بعد ٣-٤ أسابيع.	٢٨
القمح	البياض الدقيقي.	٣ - ١٠ مل	يرش عند ظهور الإصابة وتستخدم الجرعة العليا في حالة الإصابة الشديدة و يعاد الرش بعد ٣-٤ أسابيع.	٢٨
	الأصداء، اللطخات.	٥ - ١٠ مل		
الشوفان	الأصداء، اللطخات.	٥ - ١٠ مل	يرش عند ظهور الإصابة وتستخدم الجرعة العليا في حالة الإصابة الشديدة.	٢٨
المشمش	الأصداء.	٥ مل	يرش عند ظهور الإصابة على ان لا تتجاوز ه اضافات خلال الموسم الواحد.	٣
اللوزيات، الكرز، الدراق، الخوخ.	الاعفان.	٥ مل	يرش عند ظهور الإصابة وقبل أسبوع من الحصاد.	٣

تحذير : عدم استخدام المبيد إلا على المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.

فترة تجريم دخول الحقل المرشوش :

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٤٨ ساعة على آخر معاملة رش.

قابلية الخلط :

قابل للخلط مع المبيدات الفطرية الأخرى وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش.

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.