

فابكو

المجموعة:

Benzothiadiazinone

بلاست - ١,٤٤%

مبيد عشبي زراعي سام

مركز قابل للذوبان



مبيد عشبي اختياري يعمل بالملاسة يمتص عن طريق المجموع الخضري للأعشاب كما انه يمتص عن طريق الجذور، يكافح عدد من الأعشاب الحولية عريضة الأوراق.

التركيب: كل لتر يحتوي على :

بنزازون ١,٤٤% و/ح (مادة فعالة)

الخواص:

بلاست - ١,٤٤%: مبيد عشبي اختياري يعمل بالملاسة بشكل أساسي يكافح الأعشاب الحولية عريضة الأوراق.

بلاست - ١,٤٤%: يعتبر ذو سمية خفيفة للتدبيات وخفيف السمية للنحل.

الاستعمالات:

المحصول	الأعشاب	١٤٠ مل / دونم ^(١)	٢١٠ مل / دونم	٢٨٥ مل / دونم
		عدد الاوراق اقصي ارتفاع للأعشاب	عدد الاوراق اقصي ارتفاع للأعشاب	عدد الاوراق اقصي ارتفاع للأعشاب
حقل	حبة القلب	---	٢ - ٤	٥ سم
الفاصولياء،	مدادة	---	---	٢٥ سم
الفاصولياء	الحنطة السوداء	---	٤ ورقات	١٢,٥ سم
المجففة، الذرة،	الشبيط ^(٢)	٤ - ٢	١٥ سم	١٠ - ٦
الفسق،	الشوك البري ^(٣)	---	---	---
البازيلاء،	اليومية	---	٦ ورقات	١٠ سم
البازيلاء المجففة،	فقوس الحمار	---	حتى ورقتين	٤ - ٢
النعنع، الذرة	زهرة الشبخ	---	---	---
الببيضاء.	عشبة جمسون	٤ ورقات	١٠ سم	١٠ - ٦
	عصا الراعي	٤ ورقات	١٥ سم	١٠ - ٦
	رجل الاوز	٤ ورقات	٢,٥ سم	٥ سم
	قحوان	---	٥ سم	٧,٥ سم
	شب النهار	---	٤ ورقات	١٥ سم
	خردل	٤ ورقات	١٠ سم	١٠ - ٦
	عنب الديب	---	---	٦ - ٢
	بوانستية ^(٣)	---	٦ ورقات	١٠ سم
	رجلة	---	٤ ورقات	٢,٥ سم
	فجل بري	---	٦ - ٢	١٠ سم
	عشبة الخنازير	---	---	٦ - ٤

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

فابكو

المحصول	الأعشاب	١٤٠ مل / دونم ^(١)	٢١٠ مل / دونم	٢٨٥ مل / دونم
		عدد الأوراق أقصى ارتفاع للأعشاب	عدد الأوراق أقصى ارتفاع للأعشاب	عدد الأوراق أقصى ارتفاع للأعشاب
حقول الفاصولياء، الفاصولياء المجففة، الذرة، الفسق، البازيلاء، البازيلاء المجففة، التنعج، الذرة البيضاء.	كيس الراعي ^(١)	---	حتى ٦ ورقات	١٠ - ٦ سم
	العشبة الحمراء ^(٢)	---	٦ - ٤	١٠ - ٦ سم
	سنا	---	---	حتى الورقة الريشية الأولى
	سببان	---	---	٥ - ٣ سم
	أبو طيلون	---	حتى ٦ ورقات	٨ - ٦ سم
	دوار الشمس (بري)	حتى ٢ ورقة	حتى ٤ ورقات	١٢,٥ سم

دونم = ١٠٠٠ م^٢

(١) إذا حدث نمو للأعشاب مرة أخرى اعد الرش بمعدل ١٤٠ مل / دونم بعد ٧ - ١٤ يوم من الرش الأولى.

(٢) لا ترش قبل ظهور الأوراق الحقيقية وبنفس المرحلة المبينة في الجدول.

(٣) إذا حدث نمو للأعشاب مرة أخرى يتم الرش بنفس الجرعات بعد ٧ - ١٠ يوم من الرش الأولى.

(٤) لا يتم الرش قبل ظهور محاميل البذور.

(٥) في حال عودة الإنبات للأعشاب كرر الرش بالمبيد حتى تتخلص منها حسب الضرورة.

الاستعمال على الرز :

- معدل الاستعمال ٢١٠ - ٢٨٥ مل / دونم وأقصى ارتفاع عن التربة (١٠ - ٣٨ سم)، معدل الارتفاع فوق مستوى الماء من (٥ - ٢٥ سم).

- في حال عودة الإنبات للأعشاب كرر الرش بالمبيد حتى تتخلص منها حسب الضرورة.

الفاصولياء، الفاصولياء الجافة:

- وقت التطبيق: بعد ظهور وتوسع أول ثلاثية أوراق بالكامل.
- قد يحدث اصفرار للأوراق تحت بعض الظروف و يتم تجاوز الإصابة المؤقتة.
- لا يطبق على محاصيل الترمس أو العدس للحساسية الشديدة.

الذرة والذرة الرفيعة

- وقت التطبيق: قبل الإزهار.
- لا تسمح للرعي بالدخول الى المناطق المعاملة قبل مرور ١٢ يوماً بعد التطبيق.
- لا يجب أن تتجاوز حد التطبيق ٩٤٦ جرام لكل فدان في الذرة الرفيعة.
- لا يطبق على الذرة الرفيعة في مرحلة التفتح.

البازيلاء، البازيلاء الجافة:

- يطبق بعد ظهور أول ٣ أزواج من الأوراق (العقد) وقبل الإزهار.
- قد تحدث إصابة لنبات البازيلاء مثل الاصفرار والتبقع أو حرق الأوراق في ظل ظروف معينة. عادة ما يتم تجاوز الإصابة المؤقتة دون تأخير.
- تجنب التطبيقات لفترة طويلة في الطقس البارد حيث تقل فعالية المكافحة.
- لا تقم بتطبيق المنتج على البازيلاء الجافة خلال ٣٠ يوماً من الحصاد.
- لا تقم بتطبيق المنتج على البازيلاء النضرة في غضون ١٠ أيام من الحصاد.
- لا تطبق على البازيلاء المصابة بتعفن الجذور.
- لا يطبق على محاصيل الترمس أو العدس للحساسية الشديدة.
- لا تستخدم هذا المنتج عندما تكون البازيلاء في مرحلة التفتح.

الفول السوداني:

- يطبق عند مرحلة التصعد.
- يمكن تغذية علف الفول السوداني للماشية.

• للحصول على معلومات عن الاسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

فابكو

تحذير : عدم استخدام المبيد إلا على المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمالات.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش :

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على آخر معاملة رش.

فترة تحريم الرعي للحيوانات :

يجب عدم رعي أو تغذية الحيوانات إلا بعد مرور ١٢ يوم على آخر معاملة رش.

قابلية الخلط :

قابل للخلط مع جميع المبيدات ما عدا القلووية منها وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش.