

فابك

المجموعة :
Pyrethroid

بيلاثرين - ٥٪



**مبيد حشري زراعي سام
مركز قابل للاستحلاب**

مبيد حشري بايرثرويد غير جاهزي يعمل عن طريق الملامسة والمعدة وله تأثير أيضاً على الجهاز العصبي المكافحة الحشرات القارضة في الفاصولياء، الملفوف، الزهرة، الفلفل، الثوم، البندورة، الخس، البصل، البطاطا، البطيخ، الخيار، اللو زيات، التفاحيات، الذرة الشامية والمحاصيل الحقلية.

التركيب: كل لتر يحتوي على :

٥٪ (مادة فعالة) وبيتاسيفلوثررين

الخواص:

بيلاثرين - ٥٪ : مبيد حشري بايرثرويد غير جاهزي يعمل عن طريق الملامسة والمعدة كما أن له تأثير على الجهاز العصبي.

بيلاثرين - ٥٪ : له تأثير صاعق سريع.

بيلاثرين - ٥٪ : فعال ضد الحشرات وخاصة ضد الديدان الفاتكة بأوراق النبات وثمارها وكذلك حفار الساق وبعض الحشرات الماصة.

الاستعمالات:

| الفترة الآمنة (أيام) | نسبة الاستعمال /٢٠٪ | الافعنة | المحصول |
|----------------------|---------------------|---|--|
| ٧ | ١٢-١٠ مل | فرashaة الثوم، دودة لوزة القطن، فراشاة الملفوف، دودة ورقة القطن | الفاصلية، الملفوف، الزهرة، الفلفل، الثوم، البندورة، الخس، البصل، البطاطا، البطيخ والخيار. |
| ٧ | ١٠ مل | ديدان المراعم والثمار والأوراق، حفارات الأوراق وبسيلا الأ蛟اص | التفاح، الدراق، النكتارين، الجوافة. |
| ١٤ | ٢٠-١٠ مل | دودة لوزة القطن، دودة ورقة القطن المصري وحفار ساق الذرة | الذرة الشامية |
| ٧ | ١٢-٦ مل | الديدان القارضة | المحاصيل الحقلية (الذرة الأزرق، القمح، الدخن، الذرة البيضاء، الشوفان، الترمس، الحمص، العدس، الفول) |

تحذير:

تجنب استعمال المبيد على المحاصيل الزراعية غير الواردة في جدول الاستعمالات مع مراعاة فترة الآمان قبل عملية القطف.

فترة تعييم دخول الحقل المرشوش :

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٤٨ ساعة على آخر معاملة رش.

قابلية الغطاء: قابل للخلط مع معظم المبيدات الحشرية والفطرية وينصح بعمل تجربة خلط مصغر قبل الرش.

* للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.