

فابك

المجموعة :
Copper
Compound

ب-أوكسي رايد ٥٠%

مبيد فطري زراعي سام
مسحوق قابل للبلل



مبيد فطري وقائي يرش على الأوراق يعمل باللامسة، يستعمل لكافحة البياض الزغبي واللفحات والأصاء والتبعع البكتيري والتبعع الزاوي والتبقع البني وتعدد الأوراق وتنقب الأوراق وتلطخ الأوراق والانثراكتوز والجرب وما لا نوز على المحاصيل الواردة في جدول الاستعمالات.

التركيب: كل كغم يحتوي على :

٥٠٪ و / و (مادة فعالة)

أوكسي كلوريد النحاس

الخواص:

ب-أوكسي رايد ٥٠٪: مبيد فطري وقائي يرش على الأوراق يعمل باللامسة، حيث يجب ان تتم الإضافة للمحاصيل قبل أن تبدأ الأباغ الفطرية بالنمو.

ب-أوكسي رايد ٥٠٪: يكافح مدى واسع من الامراض الفطرية على مدى واسع من المحاصيل.

ب-أوكسي رايد ٥٠٪: ليس له اي تأثير سلبي على النبات اذا استعمل بالنسبة الموصى وقد يتسبب حدوث ضرر لأوراق البرقوق والدرارق خاصة عند درجات الحرارة المنخفضة.

الاستعمالات:

المحصول	العنبر	البطاطا	البنودرة	الخس	الجزر
الملحش، الخوخ، الكرز، الدراق، اللوز	الاجاص، التفاح	الليمون، البرتقال، الباوملي، المندرين، جريب فروت	اللوفون، البندورة	الخيار، القرع، الكوسا، البطيخ	الزهرة، الملفوف
تشق الأوراق، تعدد الأوراق	الجرب	تبقع الأوراق الأسود، مالانوز	اللفعحة المبكرة، اللفعحة المتأخرة، التبغ البكتيري، التبغ السبستوري، التقرح	البياض الزغبي، التبغ البكتيري	تبقع الأوراق الأسود
في مرحلة انتشار البراعم وخالل الأسبوع الاول من تفتح البراعم ويعاد الرش كل ١٠-٧ يوم.	يعاد الرش كل ١٤-١٠ يوم.	يضاف ٣٠ مل من زيت الصيفي. يتم الرش عند سقوطه ٧٥-٥٥٪ من البنلات.	يعاد الرش كل ٧ أيام في ظروف الرطوبة المناسبة ويعاد الرش كل ١٤-٧ يوم.	- يعاد الرش كل ١٤-١٠ يوم.	- يعاد الرش كل ١٤-١٠ يوم.
٥٠ غم / لتر ماء	٥٠ غم	٦٠-٤٠ غم	٤٥-٤٠ غم	٥٠ غم	٥٠ غم
معدل الاستعمال	معدل الاستعمال	معدل الاستعمال	معدل الاستعمال	معدل الاستعمال	معدل الاستعمال

* للحصول على معلومات عن الاستعماالت الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

فابكو

المحصول	المرض	معدل الاستعمال	طريقة ووقت الاستعمال
الكرفس	اللحفة المبكرة، تبقع الأوراق	٥٠ غم / لتر ماء	يعاد الرش كل ١٤-٧ يوم.
البصل	البياض الغربي	٥٠ غم	يعاد الرش كل ١٠ أيام.
الفول	الصدأ، التبقع الشوكولاتي	٥٠ غم	يعاد الرش كل ١٤-١٠ يوم.
الباذيلاء	اللفحات	٥٠ غم	يعاد الرش كل ١٤-١٠ يوم.
نباتات الزينة	تبقع الأوراق الفطري، البياض الغربي	٦٠ غم	- يعاد الرش كل ١٤-٧ يوم. - يجب عمل تجربة رش مصغرة قبل الرش على نطاق واسع لفحص حساسية النبات.

فترة الأمان:

١ يوم على جميع المحاصيل الواردة في جدول الاستعمالات.

تحذير :

تجنب استعمال المبيد على المحاصيل غير الواردة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.

فترة تحرير دخول الحقل المرشوش :

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على آخر معاملة رش.

قابلية الخطأ :

قابل للخلط مع معظم المبيدات ما عدا القلوية مثل الكبريت الجيري وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش.

* للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.