

فابكو

المجموعة:
Aryloxyphenoxypropionate
N.A^(١)

توفاب - ٣٠٪

مبيد عشبي زراعي سام
مركز قابل للاستحلاب



مبيد عشبي انتقائي لمكافحة الأعشاب الرفيعة والحوالية مثل الشوفان البري، حشيشة الكناري (شعير الفأر) وأعشاب الشيلم في حقول القمح.

التركيب: كل لتر يحتوي على :

٢٤٪ و/ح (مادة فعالة)
٦٪ و/ح (مادة فعالة)

(١) كلوديناغوب بروبيل
(٢) كلوكونتوسيت ميكسيل

الخواص:

توفاب - ٣٠٪ : مبيد عشبي جهاز انتقائي يستخدم بعد الانبات في الفترة النشطة من نمو الأعشاب.
توفاب - ٣٠٪ : مبيد عشبي لمكافحة الأعشاب الرفيعة والحوالية مثل الشوفان البري، حشيشة الكناري (شعير الفأر) وأعشاب الشيلم في حقول القمح.

الاستعمالات:

المحصول	الأعشاب	معدل الاستعمال / هكتار	موعد الاستعمال
القمح من ورقتين حتى اخر مرحلة التعقيد .	الشوفان البري.	٦٥ مل من المبيد + ١ لتر من مادة لاصقة / ١٠٠ لتر ماء.	يستعمل عندما تكون الاعشاب من ورقتين الى خمسة ورقات.
		٨٥ مل من المبيد + ١ لتر من مادة لاصقة / ١٠٠ لتر ماء.	يستعمل عندما تكون الاعشاب من ورقتين الى منتصف مرحلة الاشطاء.
	حشيشة الكناري (شعير الفأر)	٨٥ مل من المبيد + ١ لتر من مادة لاصقة / ١٠٠ لتر ماء.	يستعمل عندما تكون الاعشاب من ورقتين الى ثلاثة أوراق.
		١٢٥ مل من المبيد + ١ لتر من مادة لاصقة / ١٠٠ لتر ماء.	يستعمل عندما تكون الاعشاب من ورقتين الى خمسة ورقات.
اعشاب الشيلم.		١٦٠ مل من المبيد + ١ لتر من مادة لاصقة / ١٠٠ لتر ماء.	يستعمل عندما تكون الاعشاب من ورقتين الى بداية مرحلة الاشطاء .
		١٦٠ مل من المبيد + ١ لتر من مادة لاصقة / ١٠٠ لتر ماء.	يستعمل عندما تكون الاعشاب من ورقتين الى اربعة ورقات.
		٢١٠ مل من المبيد + ١ لتر من مادة لاصقة / ١٠٠ لتر ماء.	يستعمل عندما تكون الاعشاب من ورقتين الى بداية مرحلة الاشطاء.

هكتار = ١٠٠٠٠ م^٢

دوم = ١٠٠٠ م^٢

تحذير : عدم استخدام المبيد إلا على المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمالات.

ملاحظات :

- لا يتم الرش أثناء هطول الأمطار الا بعد ساعتين.
- لا يتم الرش عندما يكون النبات في حالة إجهاد مثل أن يكون جفاف للتربة، رطوبة عالية، نقص عناصر، إصابات حشرية أو مرضية او عند حدوث الصقيع.
- يجب معايرة آلة الرش قبل البدء بالمكافحة.
- يجب أن يكون الرش متساويا ومتجانسا في كل المنطقة المراد معاملة.

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش؛

يجب عدم دخول الحقل المرشوش بدون الملابس الواقية قبل جفاف محلول الرش .

فترة تحريم الرعي للحيوانات؛

يجب منع الحيوانات من الرعي في المناطق المعاملة حديثاً .

قابلية الخلط ؛

- يجب عمل تجربة خلط مبدئية قبل خلط المبيد مع غيره من المبيدات العشبية.
- عند خلط توفاب - ٣٠% مع مبيدات عشبية اخرى يتم استخدام مادة لاصقة مناسبة.
- غير قابل للخلط مع المواد الفعالة:
- DIURON, TRIASULFURON, (BROMOXYNIL + DICAMBA + MCPA)
- وجميع مركبات ٢، ٤- د، بالنسبة لهذه المركبات يتم رش توفاب - ٣٠% اولا وبعد ١٠ ايام على الاقل يتم رش هذه المركبات على حدا.
- يمكن خلطه مع مبيد حشري مثل التراسيديين - ٤٠% .