

فابكو

المجموعة:

Triazole

تبييزول - ٢٥%



مبيد فطري زراعي سام / مسحوق قابل للبلل

مبيد فطري جهازى ذو تأثير وقائى وعلاجى لمكافحة الأمراض الفطرية التي تصيب المحاصيل الزراعية ويستخدَم لحماية البذور وقت الإنبات.

التركيب : كل كغم يحتوي على :

٢٥% و / و (مادة فعالة)

تبييكونازول

الخواص :

تبييزول - ٢٥% : مبيد فطري جهازى ذو تأثير وقائى وعلاجى، يمتص بسرعة في الأجزاء الخضرية من النبات.

تبييزول - ٢٥% : مبيد فطري لمكافحة الأمراض على المحاصيل الزراعية الواردة في جدول الاستعمالات.

تبييزول - ٢٥% : قليل السمية على النحل.

الاستعمالات : ١- الرش الخضري:

المحصول	المرض	معدل الاستعمال	موقع الاستعمال	عدد الرشات	فترة الأمان (أيام)
اللوز.	مونيليا، البياض الدقيقي.	٢٠٠ غم / هكتار	الحقل المفتوح	١	٢١
الباذنجان.	البياض الدقيقي.	٦٠٠ غم / هكتار (٦٠ غم / ٢٠٠ لتر ماء)	الحقل المفتوح، البيوت المحمية	٣	١٤
الشعير.	الأصداء، البياض الدقيقي، الأسمرار، الجرب، التبغ، السبنوري.	٧٥٢ غم / هكتار (٧٥ غم / ٢٠٠ لتر ماء)	الحقل المفتوح.	١	٣٠
الفاصولياء.	الأصداء، التبغ.	١ كغم / هكتار (١٠٠ غم / ٢٠٠ لتر ماء)	الحقل المفتوح.	١ - ٢	١٤
العنب.	البياض الدقيقي.	٦٠٠ غم / هكتار (٦٠ غم / ٢٠٠ لتر ماء)	الحقل المفتوح.	٢	١٤
الجوز.	تبغع الأوراق المبكر، تبغع الأوراق المتأخر، الأصداء، التلطخ الشبكي.	١ كغم / هكتار (١٠٠ غم / ٢٠٠ لتر ماء)	الحقل المفتوح.	١	٢١
الخوخ.	مونيليا، البياض الدقيقي.	٢٠٠ غم / هكتار (٢٠ غم / ٢٠٠ لتر ماء)	الحقل المفتوح	١	٢١
دوار الشمس.	تعفن الساق، قزح الساق.	٥٠٠ غم / هكتار (٥٠ غم / ٢٠٠ لتر ماء)	الحقل المفتوح	١	٢١
الفلفل الحلو.	البياض الدقيقي.	١ كغم / هكتار (١٠٠ غم / ٢٠٠ لتر ماء)	الحقل المفتوح	١ - ٢	٧
البندورة	اللفحة المبكرة.	٦٠٠ غم / هكتار (٦٠ غم / ٢٠٠ لتر ماء)	الحقل المفتوح، البيوت المحمية	١ - ٣	١٤

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

فايكو

المحصول	المرض	معدل الاستعمال	موقع الاستعمال	عدد الرشاش	فترة الأمان (أيام)
القمح الطري.	الأصداء، البياض الدقيقي، الاسمرار، الجرب.	٥٠٠ غم / هكتار (٥٠ غم / لتر ماء)	الحقل المفتوح.	١ - ٢	٦٠
القمح .	التبقع السبتيوري.	١ كغم / هكتار (١٠٠ غم / لتر ماء)	الحقل المفتوح.	١ - ٢	٦٠
البصل.	التلطيخ الارجواني.	٧٥٢ غم / هكتار (٧٥ غم / لتر ماء)	الحقل المفتوح.	١	٢١

تحذير : عدم استخدام المبيد إلا على المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.

٢- تعقيم البذور: يستعمل تيبينزول - ٢٥٪ لحماية البذور وقت الإنبات كما يلي :

المحصول	المرض	معدل الاستعمال غم / ١٠٠ كغم بذور
الشعير.	تبقع الأوراق الطولي، التفحم المغطى، التفحم السائب الكاذب، لفحة وتعفن البذور المتسببة عن الفطر <i>Fusarium</i> ، التفحم السائب الحقيقي.	٤ - ١٢
الشيلم.	التفحم السائب.	٤ - ١٢
القمح.	التفحم النتن، التفحم السائب، لفحة وتعفن البذور المتسببة عن الفطر <i>Fusarium</i> ، تعفن الجذور المتسبب عن <i>Cochliobolus sativus</i> .	٤ - ١٢
الذرة.	التفحم الرأسي، التفحم السائب.	٣٠

تحذير : البذور المعاملة غير صالحة للإستهلاك البشري.

طريقة خلط البذور :

تضاف الكمية المطلوبة من المبيد الى ١٠٠ كغم بذور وتمزج جيدا مع ٣٠٠-٥٠٠ مل ماء حسب الحاجة.

فترة تجريم دخول الحقل المرشوش :

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على آخر معاملة رش.

قابلية الخلط :

قابل للخلط مع معظم المبيدات المعروفة، ولكن يفضل عمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش.