

راتريل - ٧٥، ٠٠٪

مبيد قوارض سام جدا
مسحوق جاهز للاستعمال



مبيد قوارض مانع للتخثر اظهر فعالية مميزة ضد جميع أنواع القوارض ويمكن استخدامه في جميع أماكن تواجد القوارض .

التركيب: كل كغم يحتوي على :

٧٥، ٠٠٪ و/و (مادة فعالة)

كوماتيراثيل

الخواص :

- راتريل - ٧٥، ٠٠٪ : يقضي على جميع أنواع الفئران والجردان عن طريق تناول كميات قليلة خلال عدة أيام متتالية حيث أن تناوله مرة واحدة فقط لا يعطي النتائج المطلوبة.
- راتريل - ٧٥، ٠٠٪ : مقبول لدى القوارض التي تستسيغ طعمه ولا يسبب لها أي حذر بتناوله.
- راتريل - ٧٥، ٠٠٪ : يسبب للجردان موتاً غير مؤلم كالموت الطبيعي الذي يتسبب عن الشيوخة بدون أي أعراض أخرى بحيث أن الجردان الموجودة لا تأخذ حذراً من ذلك.
- راتريل - ٧٥، ٠٠٪ : لا يسبب تسمم ثانوي للقطط.

توصيات الاستعمال :

- ينصح لمكافحة الجردان في المخازن، الحقول، الاسطبلات، مأوي وحدايق الحيوانات، المسالخ، زرائب الماشية، مستودعات البضائع والمحطات، مكبات النفايات، محطات الصرف، الموانئ، المناجم... الخ.
- يستعمل المبيد في برامج مكافحة الجردان في المدن والقرى. للحصول على مكافحة جيدة يجب تحديد كثافة الجردان ومعاليتها لمدة طويلة وإعادة استخدام المبيد إذا لزم الأمر.
- يمكن استخدام المبيد لمكافحة القوارض المتواجدة في الحقول الزراعية.

طريقة الاستعمال :

يمكن أن يستخدم المبيد بطريقتين :

- الطريقة الأولى : راتريل - ٧٥، ٠٠٪ مسحوق جاهز للاستخدام في مكافحة الجردان. يستعمل عن طريق نثره في طبقات غير رقيقة في أماكن تواجد الجردان. يجب تفقد الكمية المضافة وإعادة استخدامها إذا لزم الأمر.
- الطريقة الثانية : يمكن خلط راتريل - ٧٥، ٠٠٪ جيداً مع حبيبات القمح، الشعير، الذرة... وغيرها بحيث يتم خلط ١ جزء من المبيد مع ١٩ جزء من مادة الطعم وتوضع في أماكن تواجد الجردان وفي مخابئها وأماكن سيرها. ويجب تفقد الكمية المضافة وإعادة استخدامها إذا لزم الأمر.

التركيبية التالية أثبتت فعاليتها والتي تتكون من : ٥٥٠ غم ذرة + ٣٥٠ غم شوفان + ٥٠ غم سكر + ٥٠ غم من المبيد .

تحذيرات :

- يجب عدم لمس مسحوق المبيد بالأيدي العارية، لأن رائحة الإنسان تعتبر كمحذر للقوارض.
- يجب نثر مسحوق المبيد في أماكن مرور الجردان وحول مخابئها حتى ظهور أعراض المكافحة.
- يجب وضع مسحوق المبيد في أماكن بعيدة عن تواجد الطعام.
- يكن نقل مسحوق المبيد بعد ٥-٨ أيام من إضافته إلى مكان جديد شريطة عدم لمسه بالأيدي.
- استمرار إضافة المبيد لمدة ١٥ يوم حتى استهلاك الكمية كاملة للحصول على نتائج أكيدة.
- لا يجب وضع مسحوق المبيد في مكان مفتوح.
- يجب جمع القوارض الميتة باستعمال قفازات واقية ويتم تعفيرها بمبيد حشري ووضعها في أكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق وحرقها أو دفنها.
- لا يجب وضع مسحوق المبيد في مناطق سهل الوصول إليها من قبل الاطفال أو الماشية أو الحيوانات الأليفة وغيرها.
- لا يجب رعاية المشاية في المناطق المعالجة.

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.