



فابكوا

المجموعة :
Quinone-anthraquinone
xanthone

ريبييل -٪٨٠

منفر للطيور سام

مسحوق قابل للبلل

منفر طيور يستخدم لحماية المحاصيل الخضرية وأشجار الفاكهة والمحاصيل الأخرى ومواقع الحبوب والأعلاف من الطيور

التركيب : كل كجم يحتوي على :

و/و (مادة فعالة) ٪٨٠

انثراكينون

الغواص :

ريبييل -٪٨٠ : يمنع الطيور المضرة مثل الغربان والشحرور والعصفور الدوري والزرزور من التغذى على البذار والاشتال الصغيرة والثمار والخضروات وغيرها.

ريبييل -٪٨٠ : يجعل البذار والبراعم والثمر غير لذيدة كطعام للطيور وبذلك يقلل الضرر الناتج إلى الحد الأدنى، ولكن رد فعل أنواع الطيور المختلفة يختلف كثيراً حسب الموسم وتتوفر العلف.

ريبييل -٪٨٠ : يتناسب كلية مع النباتات ولا يؤثر على نكهة البذار أو الثمر أو الخضروات.

الاستعمالات :

- معالجة البذار : (يجب معالجتها فقط قبل الزراعة).

• معدل الاستعمال :

٦٠ غ/م كغم من بذار القمح أو الشعير أو الشيلم.

٩٠ غ/م كغم من بذور الذرة الصفراء أو الشوفان أو الباكيلاه أو الفول.

• طريقة المعالجة :

معالجة ١٠٠ كغم بذار يمزج (٩٠-٦٠ غم) مع (٤٠٠-٢٠٠ مل) ماء، ثم ترش البذور المنشورة بالتساوي.

• معالجة النباتات :

٢-١ كغم /١٠٠ لتر ماء.

• ابدأ الرش عندما تظهر الدلائل الأولى لضرر الطيور على الخضروات والثمر وبذور الحبوب والدرة الناضجة وعلى العنب وغيرها من المحاصيل الزراعية.

• يجب رش جميع أجزاء النباتات المعرضة لخطر الطيور رشًا جيداً.

• فترة الأمان :

ما بين المعالجة الأخيرة وجمع المحصول ٧ أيام.

- لطرد الإوز والطيور والغربان المزعجة بعيداً من بؤر تجمعاتها بين الأماكن السكنية وحول المطارات ومواقع الحبوب والمأواد العلنية، ويستعمل كما يلي :

• طريقة الاستعمال :

يمزج (١-٢) كغم من ريبيل -٪٨٠ مع (١٠٠) لتر ماء، وذلك بإضافة كمية المستحضر إلى (٥٠) لترًا من الماء أولاً وتخلط جيداً، ثم تضاف بعد ذلك كمية الماء المتبقية مع التحرير الجيد، ثم ترش الموضع المستهدفة و يجب تكرار الرش عند الضرورة.

* للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.