

فابكو

المجموعة:
Anilinopyrimidine

ريمانيل - ٤٠%

مبيد فطري زراعي سام

مركز معلق



مبيد فطري جهازي يخترق أوراق النبات وي penetrate ليصل الى الأنسجة النباتية ليثبط عمل الفطريات ونمو الأبواغ.

التركيب : كل لتر يحتوي على :

٤٠٪ و / ح (مادة فعالة)

بايريميثانيل

الغواص :

ريمانيل - ٤٠٪ : مبيد فطري جهازي يخترق أوراق النبات وي penetrate ليصل الى الأنسجة النباتية ليثبط عمل الفطريات ونمو الأبواغ.

ريمانيل - ٤٠٪ : يمكن استخدامه داخل البيوت البلاستيكية على محصول البندورة فقط.

الاستعمالات :

الفترة الآمنة (أيام)	ملاحظات الاستعمال	معدل الاستعمال / لترماء	المرض	المحصول
١٤	<ul style="list-style-type: none"> استخدم كمية مناسبة من الماء عند الخلط مع المبيد وذلك لضمان القنطرة الكافية ووصول المبيد الى الاوراق والأزهار بشكل جيد. تبعد اول اعماله للمبيد في بداية الازهار او / او مرحلة انتشار النمار والتصاقها بعض ، وفي بداية نضج الثمار وتلوينها ثم مرحلة ما قبل الحصاد. 	٤٠ مل ٢١ مل عند الخلط مع المبيدات الأخرى	العنف الرمادي	العنب
١٤	<ul style="list-style-type: none"> لا يستخدم على أشجار الكرز يبعد الرش عندما تكون الظروف ملائمة لنمو الفطريات. لا يرش المبيد أكثر من ٣ مرات خلال الموسم ويعاد الرش بعد ٧ أيام على الأقل عند النزوم. يتم الرش في مرحلة الأزهار أو تساقط البلايلات. يجب الرش قبل الحصاد مع مراعاة فترة الآمان. 	٤٠-٢١ مل ٤٠ مل ٢١ مل عند الخلط مع المبيدات الأخرى	العفن البنى، لفححة الأزهار تشقق الأوراق، الجرب، والعفن الرمادي	المشمش، النكتاريين، الخوخ والبرقوق (لا يستخدم على أشجار الكرز)
٧	<ul style="list-style-type: none"> يبعد الرش عندما تكون الظروف ملائمة لنمو الفطريات ويعاد الرش بعد ٧-١٤ يوم على الأقل عند النزوم. يسعى باستخدام المبيد في البيوت البلاستيكية والزجاجية ولكن بشرط تهوية البيوت مدة ساعتين بعد الرش. 	١٥ مل	اللفحة المبكرة العنف الرمادي	البندورة

* للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

فابك

الفترة الأمان (يوم)	ملاحظات الاستعمال	معدل الاستعمال / لتر ماء	المرض	المحصول
٧	يبدأ الرش عندما تكون الظروف ملائمة لنمو الفطريات ويعاد الرش بعد ٧-١٤ يوم على الأقل عند النزوم.	١٥ مل	اللختة المبكرة	البطاطا البطاطا الحلوة
٧	يبدأ الرش عندما تكون الظروف ملائمة لنمو الفطريات ويعاد الرش بعد ٧-١٤ يوم على الأقل عند النزوم.	٤٠ مل ٢١ مل عند الخلط مع المبيدات الأخرى	لفحة الأوراق، عن الرقبة والتلطخ الأرجواني	البصل الثوم والكراث
٧	يبدأ الرش قبل الأزهار إلى ما قبل الحصاد ويعاد الرش بعد ٧-١٤ يوم على الأقل عند النزوم.	٤٠ مل ٢١ مل عند الخلط مع المبيدات الأخرى	العنفن الرمادي	الفراولة

تحذير:

- لا يستعمل المبيد إلا على المحاصيل الواردة في جدول الاستعمالات مع مراعاة فترات الأمان قبل عملية القطف.
- لضمان الخلط الجيد تضاف نصف كمية الماء إلى خزان الرش ومن ثم كمية المبيد ويحرك جيداً، ومن ثم تضاف باقي كمية الماء مع الاستمرار بالتحريك قبل وخلال عملية الرش.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش:

- يجب عدم دخول الحقل المعامل قبل مرور ٢٤ ساعة من المعاملة لأشجار العنبر.
- يجب عدم دخول الحقل المعامل قبل مرور ١٢ ساعة من المعاملة لباقي المحاصيل.

الأثر الضار على النبات:

يمكن أن يسبب ضرر للمحاصيل في البيوت البلاستيكية والزجاجية وذلك لأن نسبة الرطوبة فيها أعلى من ٨٠% وينصح بالتهوية الجيدة تجنبًا لحدوث تبقعات للأوراق.

قابلية الخلطة:

قابل للخلط مع معظم المبيدات والأسمدة الورقية ما عدا الكابتان -٥٠% وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش.

* للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.