

فايكو

المجموعة :
Pyrethroid

سايرمثرين - ٥%



مبيد حشري زراعي سام
مركز قابل للاستحلاب

مبيد حشري غير جهازى يعمل بالملاسة وعن طريق المعدة لمكافحة الذبابة البيضاء، الديدان القارضة، المن، دودة هريان العنب، يرقات حرشفية الأجنحة، الحفارات على محاصيل البندورة، الفلفل، البطاطا، الباذنجان، الياقوت، التفاح، الاجاص، العنب، القطن.

التركيب : كل لتر يحتوي على :

٥ % و/ح (مادة فعالة)

سايرمثرين

الخواص :

سايرمثرين - ٥ % : مبيد حشري بايرثرويدي غير جهازى يعمل بالملاسة وعن طريق المعدة.

سايرمثرين - ٥ % : مبيد حشري غير جهازى يعمل بالملاسة وعن طريق المعدة لمكافحة الذبابة البيضاء، الديدان القارضة، المن، دودة هريان العنب، يرقات حرشفية الأجنحة، الحفارات على محاصيل البندورة،

الفلفل، البطاطا، الباذنجان، الياقوت، التفاح، الاجاص، العنب، القطن

سايرمثرين - ٥ % : مبيد فعال ولا يترك أي تراكمات في البيئة .

سايرمثرين - ٥ % : له تأثير متبقي على النباتات المعاملة .

الاستعمالات :

المحصول	الآفة	معدل الاستعمال / ٢٠ لتر ماء	فترة الامان (ايام)
القطن	الديدان القارضة، دودة أوراق القطن. المن ، لقافات الاوراق.	٢٠ - ٤٠ مل ١٠ - ٢٠ مل	٧ ٧
بندورة، بطاطا، فلفل، باذنجان، ياقوت	الديدان القارضة، الذبابة البيضاء. دودة أوراق القطن.	٢٠ - ١٠ مل ١٠ - ١٢ مل	٧ ٧
التفاح، الاجاص	يرقات حرشفية الاجنحة ، الحفارات.	٢٠ - ١٠ مل	٧
العنب	دودة هريان العنب.	٢٠ - ١٠ مل	٧

تحذير :

تجنب استعمال المبيد على المحاصيل غير الواردة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش :

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٤٨ ساعة على آخر معاملة رش.

قابلية الخطأ :

قابل للخلط مع معظم المبيدات الفطرية والحشرية ما عدا القلووية منها وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش.

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.