

فايكو

المجموعة:
Triazinone

فايكور - ٧٠٪

مبيد عشبي زراعي سام
مسحوق قابل للبلل



مبيد عشبي انتقائي جهازى يمتص عن طريق الأوراق والجذور ويسير المبيد من أسفل إلى أعلى عن طريق الأوعية الخشبية الناقلة، يعمل على تثبيط عملية التمثيل الضوئي، يستعمل لمكافحة الأعشاب الحولية عريضة ورفيعة الأوراق كما يعمل على مكافحة تلك الأعشاب التي يصعب مكافحتها عبر تثبيط نموها. بعد تطبيق المبيد قد تنبت الأعشاب الحساسة للمبيد ولكن النمو يتوقف بعد ذلك وتصبح الأوراق صفراء و / أو بنية اللون بعد ٣-٥ أيام من ظهورها. سيتبع ذلك موت أنسجة الأوراق والناتج الجديدة في بعض الأنواع. بينما سيبقى البعض الآخر أخضر ولكنه متوقف عن النمو وغير قادر على المنافسة.

التركيب: كل كغم يحتوي على :

٧٠٪ و / و (مادة فعالة)

متريبيوزين

الخواص:

فايكور - ٧٠٪: مبيد عشبي جهازى انتقائي يستعمل قبل وبعد الإنبات لمكافحة الأعشاب الحولية عريضة ورفيعة الأوراق على المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمال.

فايكور - ٧٠٪: يستعمل لمعاملة طويلة الأمد كما ويعمل على مكافحة الأعشاب التي يصعب مكافحتها مما يؤمن مكافحة أكيدة.

فايكور - ٧٠٪: له اثر متبقى طويل الأمد لمكافحة الأعشاب التي تنمو بعد المعاملة مما يعني إدامة مستمرة للأعشاب.

فايكور - ٧٠٪: يحفز بوجود الرطوبة في التربة والتي يكون لها الأثر في نمو الأعشاب الحولية.

فايكور - ٧٠٪: مبيد خفيف السمية للتدييات كما أنه غير سام للنحل.

الاستعمالات:

المحصول	الأعشاب	موعد الاستعمال	معدل الاستعمال غم / ٢٠ لتر ماء	فترة الامان (أيام)
البندورة	الأعشاب العريضة مثل: الاقحوان، حشيشة جونسون، القرص، الخردل البري، الهندباء البرية، عشبة الغليون. الأعشاب الرفيعة مثل : كيس الراعي، قزازه، الحلفا، ثوم بري، عصا الراعي، الصمعة، قمح الفار، ذيل الثعلب، شعير القفار.	قبل التشتيل	١٠ (للتربة الخفيفة) ١٥ (للتربة الثقيلة)	٤٢
		بعد التشتيل، وعندما يصبح النبات نشيطا وبعد نمو معظم الأعشاب (أي بعد ١٠ أيام من عملية التشتيل). ويتم رش البندورة المسقية بعد ٢-٣ يوم بعد الري ومن ثم تنتظر ١٠ أيام قبل إعادة الري.	١٠	
البندورة المرروعة بالبنور		بعد الإنبات عندما يصبح النبات في مرحلة ٤-٦ ورقات.	١٠	
البطاطا		قبل إنبات محصول البطاطا لأنهم بالدمج الميكانيكي للمبيد مع التربة. ينصح بتطبيق المبيد مرتان لمكافحة حشيشة أبو ركية وعشبة القففاض (لحية التيس)	١٠-١٥ (للتربة الخفيفة) ١٥-٢٠ (للتربة المتوسطة) ٢٠ (للتربة الثقيلة)	٤٢

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

فابكو

المبادئ التوجيهية لتناوب تطبيق المبيدات على المحاصيل :
يوضح الجدول التالي الحد الأدنى لفترات التناوب بعد تطبيق المبيد فابكور - ٧٠% :

الزراعة فوراً دون انتظار	٤ أشهر	٨ أشهر	١٢ شهر	١٨ شهر
الذرة فول الصويا	البرسيم نبات الهليون الشعير × أعشاب العلف البندورة قصب السكر القمح ×	الشعير العدس البازيلاء القمح الفول السوداني (الحد الأقصى لعدد التطبيق ٢٤٣ غم من المادة الفعالة لكل ٤ دونم لكل موسم)	البطاطا الأرز ××	البصل الشمندر السكري الفول السوداني (معدل التطبيق < ٢٤٣ غم من المادة الفعالة لكل ٤ دونم) جميع المحاصيل الجذرية (الشمندر، الجزر، اللفت، الفجل) الأخرى غير المدرجة في هذا الملصق جميع المحاصيل الأخرى غير المدرجة في هذا الملصق

× بعد البازلاء أو العدس أو فول الصويا.

× لا تقم بتناوب زراعة الأرز بعد أي تطبيق على محصول أولي بمعدل ٤٨٦ غم من المادة الفعالة
متريبيوزين لكل ٤ دونم لكل موسم.

تجذير :

- عدم استخدام المبيد إلا على المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.
- لا تستعمل فابكور - ٧٠% على محاصيل العائلة الصليبية، العائلة القرعية، الخس، ودوار الشمس، الفراولة، البطاطا الحلوة، التبغ، البصل، الشمندر السكري.

ارشادات :

- يجب معايرة آلة الرش قبل البدء بالمعالجة.
- يجب أن تكون التربة رطبة و محروثة حراثة سطحية قبل البدء بالمعالجة.
- تجنب الرش في التربة الرملية التي تحتوي على اقل من ١٪ دبال.
- فابكور - ٧٠% قليل الفعالية على الأعشاب التالية: الاثيل، النجيل، سعبد، حبشيشة الفرس، حليان او عنب الذيب وغير كاف على شوك الفأر والأعشاب والمعمرة ذات الجذور العميقة مثل المديدة والديبق.
- استعمل فابكور - ٧٠% فقط في الحقول، وتجنب استعماله داخل البيوت الزجاجية والبلاستيكية والأنفاق.
- تجنب استخدام فابكور - ٧٠% على البندورة (المزروعة بالبذور) عندما يصبح النبات في مرحلة اقل من مرحلة ٤ أوراق.
- عند استعمال فابكور - ٧٠% على البطاطا يوصى باستعمال الجرعة الأعلى عندما تكون التربة غنية بالمواد العضوية، واستعمال الجرعة الأدنى عندما تكون التربة فقيرة بالمواد العضوية.
- بعض أصناف البطاطا حساسة للمبيد فابكور - ٧٠% مثل جيرلا، ماريس بيبير، بلانكا. لذلك يجب استعمال الجرعة الدنيا على الأعشاب الظاهرة وقبل إنبات البطاطا.
- يجب عمل تجربة لفحص حساسية أصناف البطاطا الجديدة المزروعة قبل استعمال المبيد فابكور - ٧٠% وذلك من خلال رش مساحة صغيرة من الحقل.

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

فايكور

- يجب حراثة الأرض قبل زراعة الحبوب والقرعيات.
- اتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب كل اتصال مباشر أو غير مباشر (مثل انجراف الرش) مع النباتات أو المناطق غير المستهدفة.
- يجب مكافحة الأعشاب مبكراً عند مراحل النمو المبكرة (عند ارتفاع أقل من ١٠ سم).
- يجب تناوب على استخدام المبيد فايكور - ٧٠% مع مبيدات الأعشاب غير Group 5 herbicide
- تجنب استخدام أكثر من تطبيقين للمبيد فايكور - ٧٠% وأي مبيدات أعشاب أخرى من Group 5 herbicide في الموسم الواحد ما لم يخلط مع مبيد أعشاب ذو طريقة عمل مختلفة للأعشاب التي يصعب السيطرة عليها.
- دمج الممارسات الغير كيميائية لمكافحة الأعشاب مثل الحراثة (المكافحة الميكانيكية) وتناوب المحاصيل كجزء من البرنامج المتكامل لمكافحة الأعشاب.
- لا تستخدم المبيد عندما تساعد سرعة الرياح على انجراف المبيد خارج المنطقة المخصصة للتطبيق. يجب اجراء التطبيق عندما تكون الرياح لطيفة ومتواصلة وباتجاه ثابت (٢ - ١٠ ميل في الساعة).
- عند تطبيق المبيد في الظروف الحارة والجافة يجب معايرة الرش بحيث تكون القطرات أكبر لتقليل تأثيرات تبخر.
- لا يطبق المبيد اثناء تدخلات درجة الحرارة وانقلابها.
- تحقق من البخاخ اثناء التطبيق للتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح والرش بنمط موحد.
- تجنب الفجوات في عملية الرش التي تسمح للأعشاب بالنمو في التربة غير المعالجة. لا يطبق المبيد عندما تفضل الظروف الجوية انجراف الرش و / أو عندما تكون المحاصيل الحساسة للمبيد بما في ذلك الكرنب أو الملفوف أو الزهرة أو القرنبيط أو البروكلي أو اللفت أو الجرجير أو البصل أو البازلاء أو الفراولة مزروعة في الحقول المجاورة أو في المناطق التي ينمو فيها القمح في التربة الخشنة.
- لا يطبق على البطاطا الحلوة.
- لا يجب زراعة المحاصيل الحساسة بما في ذلك الكرنب أو الملفوف أو الزهرة أو القرنبيط أو البروكلي أو اللفت أو الجرجير أو البصل أو البازلاء أو الفراولة أو البصل أو الخس أو القرعيات خلال موسم الزراعة التالي بعد تطبيق المبيد فايكور - ٧٠%. (يرجى الاطلاع على جدول تناوب المحاصيل المذكور أعلاه)

فترة تحریم دخول الحقل المرشوش:

يجب عدم دخول العمال إلى الحقل المرشوش قبل مرور ١٢ ساعة على آخر معاملة رش.

فترة تحریم الرعي للحيوانات:

يجب عدم رعي أو تغذية الحيوانات إلا بعد مرور ٤٠ يوم على آخر معاملة رش.

قابلية الخلط :

قابل للخلط مع معظم المبيدات العشبية ما عدا التراكيب ذات التراكيز المرتفعة ويجب عمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش.