

فابكو

المجموعة :
Pyrethroid

فابكوسيدين - ٢٠٪



مبيد حشري زراعي سام
مركز قابل للاستحلاب

مبيد حشري بايرثرودي غير جهازي يستعمل لمكافحة العديد من الآفات الواردة في جدول الاستعمالات

التركيب : كل لتر يحتوي على :

٢٠٪ و/ح (مادة فعالة)

فنفاليريت

الخواص :

فابكوسيدين - ٢٠٪ : مبيد غير جهازي يعمل بالملامسة السريعة .

فابكوسيدين - ٢٠٪ : يستعمل لمكافحة عدد كبير من الآفات التي تصيب المحاصيل التالية: ملفوف، زهرة، خس، بندورة، فاصولياء، خيار، كوسا، بطاطا، التفاحيات، اللوزيات، الفصّة.

الاستعمالات :

المحصول	الآفة	نسبة الاستعمال ٢٠٪ لتر ماء	فترة الأمان (أيام)
ملفوف، زهرة، خس، بندورة، فاصولياء، بطاطا. خيار، كوسا.	المن، التريس، ديدان الأوراق، ديدان الثمار، الذبابة البيضاء، الخنافس.	٤ - ٨ مل	٧
التفاح، الاجاص، الخوخ، الكرز، اللوز، المشمش، الدراق، التكتارين	حفار الاوراق والبراعم، المن، ديدان الثمار، ذبابة الثمار، البسيلا.	٤ - ٨ مل	١٤
الفصّة.	ديدان الاوراق والبراعم، المن.	٢,٥ - ٥ مل	٢١

تحذير :

عدم استعمال المبيد على المحاصيل غير المذكورة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش :

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور يومين على آخر معاملة رش.

قابلية الخلط :

يخلط مع جميع المبيدات ما عدا القلوية منها وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل ٢٤ ساعة من الرش.

* أسماء تجارية أخرى : فابكوليريت - ٢٠٪ EC .

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.