

فابكو

المجموعة:
Avermectin

فابكومك جولد - ٨,٤ %

مبيد حلم وحشري زراعي سام
مركز معلق



مبيد حلم وحشري يعمل بالملاسة وعن طريق الجهاز الهضمي فعال في مكافحة مدى واسع من الحشرات التي تصيب المحاصيل الزراعية الواردة في جدول الاستعمالات.

التركيب : كل لتر يحتوي على :

٨,٤ % و/ح (مادة فعالة)

ابامكتين

الخواص :

فابكومك جولد - ٨,٤ % : مبيد حلم وحشري يعمل بالملاسة وعن طريق الجهاز الهضمي فعال لمكافحة الحشرات الواردة في جدول الاستعمالات وذلك في أطوارها المتحركة وخاصة طور الحشرة الكاملة والذي يصعب مكافحته.

فابكومك جولد - ٨,٤ % : ذو فعالية عالية لمدة أطول مقارنة بالمبيدات الأخرى، لإحتوائه على نسبة عالية من العنصر الفعال أفرمكتين ب أ.

الاستعمالات :

المحصول	الآفة	معدل الاستعمال ٢٠ لتر ماء	فترة الأمان (أيام)
البندورة، الفلفل، الباذنجان، البطاطا.	يرقات صانعات الأنفاق، الحلم الأحمر، ترس، عثة الدرنات	٣ مل	٣ ١٤
الخيار، الكوسا، البطيخ، الشمام.	الترس، الحلم الأحمر	٣ مل	٧
الحمضيات	الحلم الأحمر، حلم الصدأ، الترس، صانعات الأنفاق.	٢,٥ مل	١٠
الفراولة	الحلم .	٣ مل	٣
نباتات الزينة	صانعات الأنفاق. الحلم الأحمر.	٢,٥ مل ٣ مل	---

تحذير :

يجب عدم استعمال المبيد على المحاصيل الزراعية غير المذكورة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف

فترة تجريم دخول الحقل المرشوش :

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٤٨ ساعة على آخر معاملة رش أو بعد جفاف محلل الرش على المحصول المعامل.

قابلية الخلط : قابل للخلط مع معظم المبيدات باستثناء تلك المحتوية على الكابتان وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش.

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

فابكو

ملاحظات :

- تبدأ ظهور نتائج مكافحة بعد ٣-٥ أيام من الرش مع العلم بأن تأثير المبيد يبدأ بعد رشه مباشرة.
- لمكافحة الحلم يتم الرش عند بداية الإصابة.
- لمكافحة الحلم وصانعات الانفاق يتم رش الأسطح السفلية للأوراق جيدا عند بداية ظهور الإصابة.
- عند رش اشجار الحمضيات: تجنب الرش الزائد عند استخدام المبيد فابكومك جولد - ٨,٤% مع زيت البارافين.

الأثر الضار على النباتات:

لا يسبب اثر سلبي على النباتات إلا انه لا يرش على أزهار القرنفل و نباتات الاسيجة الخاصة، وسام للتفاحيات عند خلطه مع مركبات الكابتان.

تراكيب واسماء تجارية أخرى : بامكتين بلص - ٨,٤%، ليزر - ٨,٤% .

• للحصول على معلومات عن الاسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.