



فابكومك

المجموعة :
Avermectin

فابكومك - ٨٪

مبيد حلم وحشرى زراعي سام
مركز قابل للإستحلاب

مبيـد حـلـم وـحـشـرـى يـعـالـمـ بـالـلـامـسـة وـعـنـ طـرـيقـ الـجـهـازـ الـهـضـمـي فـعـالـ لـمـاـفـحـةـ الـاـفـاتـ فيـ الطـوـرـ الـكـامـلـ . وـالـتـيـ يـصـعـبـ مـاـفـحـتـهاـ كـالـحـشـرـاتـ الـوـارـدـةـ فيـ جـدـولـ الـاـسـتـعـمـالـاتـ .

التـرـكـيبـاـ: كلـ تـرـيـحتـويـ عـلـىـ :

أـبـامـكـتـينـ

المـهـبـرـاتـ :

فـابـكـومـكـ - ٨٪ : مـبـيـدـ حـلـمـ وـحـشـرـىـ فـعـالـ لـمـاـفـحـةـ الـعـدـيدـ مـنـ الـحـشـرـاتـ فـيـ طـوـرـ الـحـشـرـةـ الـكـامـلـةـ وـالـتـيـ يـصـعـبـ مـاـفـحـتـهاـ مـثـلـ : صـانـعـاتـ الـأـنـفـاقـ، الـبـيـسـيـلاـ، الـحـلـمـ الـأـحـمـرـ .

فـابـكـومـكـ - ٨٪ : ذـوـ فـعـالـيـةـ عـالـيـةـ مـلـدـ أـطـوـلـ مـقـارـنـةـ بـالـمـبـيـدـاتـ الـأـخـرـىـ ، لـاحـتوـانـهـ عـلـىـ نـسـبـةـ عـالـيـةـ مـنـ الـعـنـصـرـ الـفـعـالـ . أـفـرـمـكـتـينـ بـ ١٪ .

فـابـكـومـكـ - ٨٪ : يـسـتـعـمـلـ عـلـىـ عـدـدـ كـبـيرـ مـنـ الـمـاـصـيـلـ الـزـارـعـيـ الـاـقـتـصـادـيـ مـثـلـ الـبـنـدـورـةـ، الـخـيـارـ، الـفـرـاوـلـةـ، الـحـمـضـيـاتـ، نـبـاتـاتـ الـزـيـنةـ .

الاستعمالات :

الفترة الأمان (أيام)	معدل الاستعمال / ٢٠ لتر ماء	الافادة	المحصول
٧	٢٠-١٠ مل	صانعات الأنفاق، الحلم الأحمر.	البنادورة
٣	٢٠-١٠ مل	صانعات الأنفاق، الحلم الأحمر.	الخيار
٧	٢٠-١٠ مل	صانعات الأنفاق، الحلم الأحمر.	الفراولة
١٠	١٠ مل	البرتقال، اليومني، الليمون، البرتقال، حلم الصدا.	الجريب فروت، المندرين، الكمكوات
---	٢٠-١٠ مل	صانعات الأنفاق، الحلم الأحمر.	نباتات الزينة

تحذير : يمنع إستعمال المبيد على المحاصيل غير الواردة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.

ملاحظات :

- يجب أن لا يرش المحصول أكثر من ٥ رشات خلال الموسم.
- تبدأ ظهور نتائج المكافحة بعد ٣ - ٥ أيام من الرش مع العلم بأن تأثير المبيد يبدأ بعد رشه مباشرة.
- كمية محلول الرش يجب أن لا تزيد عن ١١٠ مل من المبيد فـابـكـومـكـ - ٨٪ لكل دونم من الخضروات ونباتات الزينة.

الأثار الضار على النبات :

- لا يسبب أثر سلبي على النباتات إلا أنه لا يرش على أزهار القرنفل ونباتات الأسيجة الخاصة.
- سام للتلفاحيات عند خلطها مع مركيبات الكابستان.

فترقة تحريم دخول الحقن الرشوش :

يجب عدم دخول الحقن المرشوش قبل مرور ٤٤ ساعة على آخر معاملة رش ويسمح بالدخول عند جفاف محلول الرش على المحصول المعامل. قabilية الخلط : قابل للخلط مع معظم المبيدات ولكن ينصح بعمل تجربة خلط مصفرة قبل ٤٤ ساعة من الرش.

* تركيب وأسماء تجارية أخرى : أـبـامـكـسـ - ٨٪ ، بـاـمـكـتـينـ - ٨٪ ، مـيـسـاـمـكـتـينـ - ٨٪ ، فـابـكـومـكـ - ٢٪ .

• للحصول على معلومات عن الامانات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.