

فايكو

المجموعة :  
Cyanoimidamide

فايكومور - ٢٠٪ SL



مبيد حشري زراعي سام  
مركز قابل للذوبان في الماء

مبيد حشري جهازى ذو تأثير عن طريق المعدة وبالملاسة لمكافحة الحشرات التي تصيب المحاصيل الواردة في جدول الاستعمالات.

التركيب : كل لتر يحتوي على :

٢٠٪ و/ح (مادة فعالة)

اسيتاميبريد

الخواص :

فايكومور - ٢٠٪ SL : مبيد حشري جهازى ذو تأثير عن طريق المعدة وبالملاسة.

فايكومور - ٢٠٪ SL : ذو تأثير أولي سريع وبأثر متبقي فعال لمكافحة حشرات عديدة مثل المن، الذبابة البيضاء، الترس، عثة ثمار التفاح، صانعات الأنفاق والبق الدقيقي التي تصيب المحاصيل الواردة في جدول الاستعمالات.

الاستعمالات :

| المحصول                                             | الأفة                                         | معدل الاستعمال<br>٢٠ / لتر ماء | فترة الامان<br>(أيام) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| الخيار                                              | المن، الترس.                                  | ١٠ مل                          | ٣                     |
| الباذنجان، الفلفل الحلو.                            | المن، الترس.                                  | ٥ مل                           | ٣                     |
| البندورة.                                           | المن، الذبابة البيضاء.                        | ١٠ مل                          | ٣                     |
| البطاطا.                                            | المن.                                         | ١٠ مل                          | ٧                     |
| الضراولة.                                           | المن.                                         | ٥ مل                           | ٣                     |
| التفاح.                                             | المن، عثة ثمار التفاح، صانعات الأنفاق.        | ١٠ - ٥ مل                      | ١٤                    |
| الاجاص.                                             | المن، عثة الثمار.                             | ١٠ - ٥ مل                      | ١٤                    |
| الدراق.                                             | المن، عثة الثمار، صانعات الأنفاق.             | ١٠ - ٥ مل                      | ٧                     |
| البطيخ.                                             | المن، الترس.                                  | ١٠ - ٥ مل                      | ٣                     |
| الليمون، البرتقال، البوملي،<br>المندرين، جريب فروت. | المن، صانعات الأنفاق، البق الدقيقي<br>الكروي. | ١٠ - ٥ مل                      | ١٤                    |
| التبغ.                                              | المن.                                         | ١٠ - ٥ مل                      | ١٠                    |

تحذير :

عدم استعمال المبيد على المحاصيل غير المذكورة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش : يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٤٨ ساعة على آخر معاملة رش.

قابلية الخطأ : قابل للخلط مع معظم المبيدات ما عدا المبيدات شديدة القلوية مثل مزيج بوردو وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش.

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.