

فابكو

المجموعة :  
Cyanimidamide

فابكومور - ٢٠% SP



مبيد حشري زراعي سام  
مسحوق قابل للذوبان في الماء

مبيد حشري جهازى ذو تأثير عن طريق المعدة وبالملاسة يمكن إضافته عن طريق التربة أو الرش الورقى لمكافحة الحشرات التي تصيب المحاصيل الواردة في جدول الاستعمالات.

التركيب : كل كغم يحتوي على :

٢٠% و/و (مادة فعالة)

اسيتامبيريد

الخصائص :

فابكومور - ٢٠% : مبيد حشري جهازى ذو تأثير عن طريق المعدة وبالملاسة، ويمكن إضافته إلى التربة أو رشه عن طريق الأوراق.

فابكومور - ٢٠% : ذو تأثير أولي سريع وبأثر متبقي فعال لمكافحة الحشرات التي تصيب المحاصيل الواردة في جدول الاستعمالات.

الاستعمالات :

المحصول	الأفة	معدل الاستعمال ٢٠ / لتر ماء	فترة الأمان (أيام)
الخيار	المن، التريس.	١٠ غم	١
الباذنجان، الفلفل الحلو.	المن، التريس.	٥ غم	١
البندورة.	المن، الذبابة البيضاء.	١٠ غم	١
البطاطا.	المن.	١٠ غم	٧
الضراولة.	المن.	٥ غم	١
التفاح.	المن، عثة ثمار التفاح، صانعات الانفاق.	٥ - ١٠ غم	١٤
الاجاص.	المن، عثة الثمار.	٥ - ١٠ غم	١٤
الدراق.	المن، عثة الثمار، صانعات الانفاق.	٥ - ١٠ غم	٧
البطيخ.	المن، التريس.	٥ - ١٠ غم	٣
الليمون، البرتقال، البوملي، المندرين، جريب فروت.	المن، صانعات الانفاق، البق الدقيقي الكروي.	٥ - ١٠ غم	١٤

تحذير :

عدم استعمال المبيد على المحاصيل غير المذكورة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية المقطف.

فترة تعريم دخول الحقل المرشوش : يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٤٨ ساعة على آخر معاملة رش.

قابلية الخلط : قابل للخلط مع معظم المبيدات ما عدا المبيدات شديدة القلوية مثل مزيج بورديو وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش.

\* أسماء تجارية أخرى : مورتال - ٢٠% SP.

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.