

فايكو

المجموعة:

Acylalanine⁽¹⁾
Copper Compound⁽²⁾

فاكوميل - بلص ٥٠٪



مبيد فطري زراعي سام / مسحوق قابل للبلل

مبيد فطري فعال وله أثر جهازى ووقائى وعلاجى لمقاومة الأمراض الفطرية التي تصيب المحاصيل الزراعية كما هو موضح في جدول الاستعمالات

التركيب : كل كغم يحتوي على :

١٥ ٪ و/و (مادة فعالة)

ميتالاكسيل⁽¹⁾

٣٥ ٪ و/و (مادة فعالة)

او كسي كلوريد النحاس⁽²⁾

الخواص :

فاكوميل- بلص ٥٠٪: مبيد علاجي ووقائي للعديد من الأمراض الفطرية التي تصيب عدداً كبيراً من النباتات.

فاكوميل- بلص ٥٠٪: ذو فعالية عالية على عدد كبير من الأمراض الفطرية التي تسبب خسائر كبيرة على

المحاصيل الزراعية.

الاستعمالات :

المحصول	المرض	معدل الاستعمال / ٢٠ لتر ماء	فترة الأمان (أيام)
التفاح، الاجاص.	البياض الدقيقي، البياض الزغبي، الجرب، التقرحات.	٣٠ - ٣٥ غم	٢١
الدراق، الكرز، المشمش، الخوخ .	البياض الدقيقي، البياض الزغبي، الجرب، التقرحات.	٣٠ - ٣٥ غم	٢١
العنب.	البياض الزغبي.	٣٠ - ٤٠ غم	٧

تحذير :

- عدم استخدام المبيد إلا على المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.

- بعض أصناف التفاح متأثرة بهذا المبيد وخاصة الصنف (Red Delicious) .

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش :

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٤٨ ساعة على آخر معاملة رش.

قابلية الخلط :

يمكن خلطه مع معظم المبيدات الفطرية والحشرية المعروفة ما عدا مركبات الكبريت، والمركبات الدايتيوكارباماتية وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش.

* تراكيب أخرى: فاكوميل - بلص - ٧٦,٥ WP (ميتالاكسيل ١٥ ٪ + او كسي كلوريد النحاس ٦١,٥ ٪ نحاس ٣٥ ٪) .

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.