



فابكو

المجموعة :
Transition metal

فريكنج

سماد نباتي / مخلبات حديد
حببيات ذاتية في الماء

مخلبات حديد ذات كفاءة عالية تستخدم لتعويض نقص عنصر الحديد في النباتات.

التركيب: كل كغم يحتوي على :

٦٪ و (مادة فعالة)

مخلبات حديد بصيغة Fe EDDHA

(نسبة الحديد على موقع Ortho-Ortho)

الغواص:

فريكنج : مخلبات حديد ذات كفاءة عالية تستخدم لتعويض نقص عنصر الحديد في النباتات.

فريكنج : يمتص بسهولة من قبل النبات.

فريكنج : يمكن إضافته عن طريق التربة او الرش الورقي.

فريكنج : يتميز بان نسبة الحديد على موقع Ortho-Ortho اكتر من ٧٠٪ مما يقلل من نسبة فقد الحديد .

الاستعمالات :

١- الإضافة إلى التربة :

المحصول	معدل الاستعمال	ملاحظات
الحمضيات اشجار الفاكهة (التفاحيات واللوزيات والزيتون)	٢٥-١٠٠ غم/شجرة	يضاف في اخر فصل الشتاء وببداية فصل الربيع بحيث يستفاد من مياه الامطار في اصال السماد الى منفذة الجذور ويكون اضافة فريكنج من خلال نظام الري
اشجار كبيرة اشجار صغيرة	٢٠-١٠٥ غم/شجرة ١٠-٣٥ غم/شجرة	يضاف فريكنج بين خطوط الزراعة ويتم خلطه بتربة ويمكن إضافته بعد اذابة بالماء او عن طريق الري بالتنقيط.
العنبر	٢٠٠٠-٥٠٠٠ غم/شجرة (٢٠-١٠)	يضاف فريكنج مباشرة قبل الزراعة.
الخضروات	٢٠٠٠ غم/نبات	يتم اذابة فريكنج بكمية وافرة من الماء ومن ثم يضاف حول قاعدة النبات ويفضل سقایة النباتات مباشرة بعد الاضافة.
نباتات الزينة المعلقة نباتات الزينة الجولية	١٥-٥ غم/نبات	يتم اذابة فريكنج بكمية وافرة من الماء ومن ثم يضاف حول قاعدة النبات ويفضل سقایة النباتات مباشرة بعد الاضافة.
الاشتال (في المشتل)	٨ غم/٢	يتم تقطيع الاشجار جيدا
السطحات الخضراء	٥-٢ غم/٢	يضاف في بداية موسم النمو وعند توافر عدد جيد من الاوراق لامتصاص السماد.

٢- الرش الورقي :

المحصول	معدل الاستعمال	ملاحظات
اشجار الفاكهة (الحمضيات، التفاحيات، اللوزيات، الزيتون).	١٠٠ غم/١٠٠ لترماء	يتم تقطيع الاشجار جيدا
الخضروات	١٥٠ غم/٢٠	يضاف في بداية موسم النمو وعند توافر عدد جيد من الاوراق لامتصاص السماد.

* للحصول على معلومات عن الاعراضات الأذوية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

فابك

ملاحظات حول الاستعمال :

- عند اضافة فريكنج للتربة فانه من المفضل طمره اما عن طريق الحراثة او سقاية المحصول لدفع السماد الى منطقة الجذور.
- عند اضافة فريكنج رشا على النبات يجب ان لا تقل كمية الماء المستخدم عن ٥٠ لتر/٢م .
- يمكن تكرار اضافة فريكنج اكثر من مرة وذلك يعتمد على درجة النقص وعمر النبات.

قابلية الخلط :

يمكن خلطه مع الاسمدة والمبيدات الزراعية وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل التطبيق.

* للحصول على معلومات عن الامساقات الاوتوكلاف والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.