



فابك

المجموعة:
Benzoylurea

فلوزيرون - ١٥%

مبيد حشري جهازي زراعي سام
منظم لنمو الحشرات (IGR)
مركز معلن

منظم نمو حشري جهازي، تبدأ فعاليته في الوقت الذي تتم عنده عملية الانسلاخ أو وضع البيض.

التركيب: كل لتر يحتوي على :

١٥٪ حشر (مادة فعالة)

تيفلوبينزيرون

الخصائص:

فلوزيرون - ١٥٪ : مبيد مثبط لتكوين طبقة الكيتين والتي تدخل في تكوين طبقة الكيوتكل للحشرة وبالتالي تجعل الانسلاخ عملية غير ناجحة.

فلوزيرون - ١٥٪ : مبيد اقتصادي وفعال بتركيز قليل.

الاستعمالات:

الفترة الآمنة (أيام)	معدل الاستعمال مل / لتر ماء ٢٠	الآفة	المحصول
٣	١٠ في حالة الاصابة الشديدة، ينصح برشة ثانية بعد سبعة أيام من الرشة الأولى.	الديدان الزاحفة، الديدان القارضة، الخنافس، الفراش، نطاط الاوراق	البنادورة، البازنجان، الفلفل، الخيار البطاطا
٢٨			
٣			الرعاعي

تحذير:

عدم استعمال المبيد على المحاصيل غير المذكورة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.

فترة تغريم دخول الحقل المشوش: يجب عدم دخول الحقل المشوش قبل مرور ٤٤ ساعة على آخر معاملة رش.

قابلية الخلط:

قابل للخلط مع معظم المبيدات وغير قابل للخلط مع المواد عالية الحموضة والمؤكسدة وينصح بعمل تجربة خلط مصغر قبل الرش.

* للحصول على معلومات عن الاعدادات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.