

فابكو

المجموعة:
Anilinopyrimidine⁽¹⁾
Phenylpyrrole⁽²⁾

فلوكسينيل - ٥,٦٢%

مبيد فطري زراعي سام
حببات قابلة للإنتشار في الماء



مبيد فطري جهازي ووقائي طويل الأمد لمكافحة الأعغان على عدد كبير من المحاصيل الزراعية الواردة في جدول الاستعمالات.

التركيب : كل كغم يحتوي على :

(٣٧,٥٪ / و (مادة فعالة)
(٢٥٪ / و (مادة فعالة)

(١) سايبيرودينيل
(٢) فلديوكسونيل

الخواص :

فلوكسينيل - ٥,٦٢% : مبيد فطري جديد يستخدم لمكافحة الأعغان، الملففات، تقع الأوراق، البياض الدقيقى على مدى واسع من المحاصيل الزراعية.

فلوكسينيل - ٥,٦٢% : ذو تركيبة مميزة من المادتين (سايبيرودينيل و فلديوكسونيل) للقضاء على الأعغان التي تصيب محصول النب، الفاصوليا، البطاطا، الكرفس، الخس، البقدونس، السبانخ، البصل، الثوم، البنودرة، البازنجان، الفلفل، البامية، افوكادو، الجواوه، مانجا، الحمضيات، الفراولة.

فلوكسينيل - ٥,٦٢% : مبيد ذو فعالية عالية طولية الامد.

الاستعمالات :

المحصول	المرض	معدل الاستعمال / ٢٠ لترماء	موعد التطبيق	الحد الأقصى من الاستخدام لستة الواحدة لتر من الماء / ٢٠ لتر من الماء	الفترة بين الرشة والأخرى	فترته الأمان (أيام)
الفول	العنن الإبيض، العنن الرمادي	٢٠ - ١٥ غم	ابداً التطبيق قبل أو عند ظهور المرض	٧٩,٤ غم	٧ أيام	يتم تكرار التطبيق بعد ٧ أيام ان كانت الظروف مواتية لتطور المرض.
البطاطا	العنن البني، المفعحة المبكرة، تقع الأوراق المستوري، البياض الدقيقى	٢٠ - ١٥ غم	بداية ظهور المرض	٧٩,٤ غم	١٤ أيام	يتم تكرار التطبيق بعد ٧ أيام ان كانت الظروف مواتية لتطور المرض.
البروكلي، الملفوف، الزهرة، الخردل، الكربن	البياض الدقيقى، لفعحة الالترناريما، تقع الأوراق	١٧ - ١٠ غم ٢٠ - ١٥ غم	ابداً التطبيق	٧٩,٤ غم	٧ أيام	يتم تكرار التطبيق بعد ١٠-٧ أيام ان كانت الظروف مواتية لتطور المرض.
الكوسا	الخيار، البطيخ، الشمام، القرع،	٢٠ - ١٥ غم	دفع الأوراق، لفعحة الساق، البياض الدقيقى	٧٩,٤ غم	٧ أيام	يتم تكرار التطبيق بعد ١٠-٧ أيام ان كانت الظروف مواتية لتطور المرض.
السبانخ	الكرفس، الخس، البقدونس، الشمندر، الجزر	٢٠ - ١٥ غم	دفع الأوراق، الاعغان، البياض الدقيقى	٧٩,٤ غم	٧ أيام	يتم تكرار التطبيق بعد ١٠-٧ أيام ان كانت الظروف مواتية لتطور المرض.
الفجل، الافت، البطاطا الحلوة	دفع الالترناريما، البياض الدقيقى	٢٠ - ١٥ غم	دفع الأوراق	٤٠ غم باقي المحاصيل	٧ أيام	يتم تكرار التطبيق بعد ١٠-٧ أيام ان كانت الظروف مواتية لتطور المرض.

* للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع المفهوس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

فابك

الفترة الآمان (أيام)	الفترة بين الرشة والأخرى	الحد الأقصى من الاستخدام لستة الواحدة / تر من الماء	موعد التطبيق	معدل الاستعمال / ٢٠ لتر ماء	المرض	المحصول
٧	يتم تكرار التطبيق بعد ١٠-٧ أيام ان كانت الطروف موافقة لتطور المرض.	٧٩,٤ غم	ابداً التطبيق قبل أو عند بداية ظهور المرض	١٥ - ٢٠ غم	لفعحة الأوراق، الطحالب، عفن الرقبة، العفن الأسود	البصل، الثوم
					أمراض التربة: العفن الأبيض (تم العاملة عند الزراعة ورشاً بين الأقلام)	البنادورة، البازنجان، الفلفل، الباذنجان
٧	يتم تكرار التطبيق بعد ١٠-٧ أيام ان كانت الطروف موافقة لتطور المرض.	٧٩,٤ غم	ابداً التطبيق قبل أو عند بداية ظهور المرض	١٥ - ٢٠ غم	الفحمة البكره، العفن الرمادي، البياض الدقيق.	الفواكه، مانجا
٢١	يتم تكرار التطبيق بعد ١٠-٧ أيام ان كانت الطروف موافقة لتطور المرض.	٧٩,٤ غم	يتم التطبيق الأول خلال فترة الإزهار المبكر	١٥ - ٢٠ غم	عفن الثمار، تبقع الأوراق، الانثراكتوز	الجواوه، مانجا
٢١	يمكن اجراء تطبيق واحد في السنة الواحدة قد يتم التطبيق ليشمل يوم الحصاد	٢٧ غم	فيعمل تطبيق واحد عند القرب من الحصاد لتغافل الثمار بعد الحصاد.	١٥ - ٢٠ غم	عفن الساق، الانثراكتوز، العفن الرمادي	الليمون
١٤	يمكن اجراء ما يصل الى ثلاثة تطبيقات اضافية الى حين فترة ما قبل الحصاد. لا يستخدم لمدة تزيد عن ٢١ يوماً.	٧٩,٤ غم	ابداً التطبيق في وقت مبكر من الإزهار.	١٥ - ٢٠ غم	الاعغان	العن
١٤	يتم تكرار التطبيق بعد ١٠-٧ أيام ان كانت الطروف موافقة لتطور المرض.	٧٩,٤ غم	ابداً التطبيق قبل أو عند الإزهار.	١٥ - ٢٠ غم	العفن الرمادي، البياض الدقيق، الانثراكتوز	الفراولة

معاملة ما بعد الحصاد :

المحصول	المرض	معدل الاستعمال	ملاحظات
الرمان	عفن الثمار، العفن الرمادي	٢٩ غم / لتر	تفطس الثمار لمدة ٣٠ ثانية في محلول الرش ثم تترك حتى جفاف محلول

تعديل:

تجنب استعمال المبيد على المحاصيل غير الواردة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الآمان قبل عملية قطف المحصول.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش:

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على آخر معاملة رش.

قابلية الخليط :

قابل للخلط مع معظم المبيدات الحشرية والفتيرية والأسمرة الورقية وينصح بعمل تجربة مصفرة قبل الرش.

* أسماء تجارية أخرى: بروكستيل - ٦٢,٥ % .

* للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع المفهوس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.