

فايكو

المجموعة:
Hydroxylanilide

فليير - ٥٠٪

مبيد فطري زراعي سام
حبيبات قابلة للإنتشار في الماء



مبيد فطري غير جهازى، وقائى وعلاجى لمكافحة الأمراض الفطرية مثل العفن الرمادى وفطريات المونيليا على المحاصيل الواردة في جدول الاستعمالات.

التركيب : كل كغم يحتوي على :

٥٠٪ و/و (مادة فعالة)

فينهكساميد

الخواص :

فليير - ٥٠٪ : مبيد فطري غير جهازى وقائى وعلاجى لمكافحة العفن الرمادى وفطريات المونيليا على العديد من أشجار الفاكهة والخضروات المدرجة في جدول الاستعمالات.

الاستعمالات :

المحصول	المرض	معدل الاستعمال ٢٠ / لتر ماء	موعد الرش	ملاحظات الاستعمال	فترة الأمان (أيام)
اللوز	اللفحات (مونيليا)	٣٤ غم	• عندما يتحول لون البراعم الى اللون الزهرى. • عند الأزهار الكامل. • عند سقوط البتلات • إلى ٢٨ يوم من سقوط البتلات.	- يجب تغطية الأزهار والأغصان والفاكهة بمحلول الرش تغطية كاملة. - لا يجب تطبيق المبيد لأكثر من رشتين متتابعتين. - الفرق بين الرش الأولى والأخرى ٧ - ١٤ يوم	٧
الخيار	العفن الرمادى (البوتريتس)	٣٤ غم	• عندما تساعد الظروف المناخية على تطور المرض. • يكرر الرش ٧ - ١٠ أيام عند الحاجة	- لا يطبق في الحقل المفتوح. - لا يجب تطبيق المبيد لأكثر من رشتين متتابعتين.	٧
الباذنجان الفلفل	العفن الرمادى (البوتريتس)	٣٤ غم			٧
البندورة	العفن الرمادى (البوتريتس)	٣٤ غم			٧
الخس، البقدونس	العفن الرمادى (البوتريتس)	٢٢ - ٣٤ غم			٣
العنب	عفن العنقود الرمادى (البوتريتس)، تثبيط البياض الدقيقى.	٢٢ غم	• الأزهار المبكر. • قبل انفلاق العنقود. • حتى يوم الحصاد.	- يعزز تثبيط فعالية المبيدات الأخرى عند استخدامه في برنامج رش البياض الدقيقى. - لا يجب تطبيق المبيد لأكثر من رشتين متتابعتين. - ٧ أيام بين الرش الأولى والأخرى.	٣
الكبوي (معاملة بعد الحصاد)	عفن الفاكهة الرمادى (البوتريتس)	٢ غم	• بعد الحصاد.	- يطبق مرة واحدة فقط. - يستخدم كتطبيق بعد الحصاد. - (معاملة غمر الفاكهة بالماء) يجب أن تبقى الفاكهة في الماء لمدة ٢٠ - ٣٠ ثانية	---
الفراولة	العفن الرمادى (البوتريتس)	٣٤ غم	• يجب التطبيق بعد الأزهار. • يكرر الرش ٧ - ١٠ أيام عند الحاجة.	- لا يجب تطبيق المبيد لأكثر من رشتين متتابعتين.	٧

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

فاكهو

المحصول	المرض	معدل الاستعمال / ٢٠ لتر ماء	موعد الرش	ملاحظات الاستعمال	فترة الأمان (أيام)
المشمش، الكرز، النكتارين، الدراق.	العض البني، اللصفحات (مونيليا)	٣٤ غم	• الازهار المبكر. • الازهار المتأخر. • أسبوعان بعد سقوط البتلات. • حتى يوم الحصاد.	لا يجب تطبيق المبيد لأكثر من رشتين متتابعتين.	٣
	العض الرمادي على الكرز (البوتريتش)	٢٢ - ٣٤ غم	• الازهار المبكر. • بكرر الرش ٧ - ١٠ أيام عند الحاجة. • حتى يوم الحصاد.		

تحذير:

- يمنع استعمال المبيد على المحاصيل غير الواردة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.
- يمنع دخول الحيوانات أو الرعي في المناطق المرشوشة والمعاملة بالمبيد.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش:

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ١٢ ساعة على آخر معاملة رش.

قابلية الخلط :

قابل للخلط مع معظم المبيدات الحشرية والفطرية والأسمدة وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش.