



فابكو

المجموعة :

Organophosphate^(١)
Pyrethroid^(٢)

فنيكيل - ٣٠٪

مبيد حشري زراعي سام
مركز قابل للإستحلاب

تركيبة خاصة لمكافحة العديد من الحشرات التي تؤثر على المحاصيل الواردة في جدول الاستعمالات.

التركيب: كل لتر يحتوي على :

٢٥٪ وح (مادة فعالة)
٥٪ وح (مادة فعالة)

فتنتروشيون^(١)
فتفاليريت^(٢)

الخواص:

فنيكيل - ٣٠٪ : مبيد غير جاهزي يعمل باللامسة والمعدة ويكافح الآفات الواردة في جدول الاستعمالات.
فنيكيل - ٣٠٪ : غير ضار للنباتات في ظروف استعماله حسب التوصيات ولكن قد يحدث ضرر للمعانة الصلبية وبعض أشجار الفاكهة عند استعماله بنسب عالية.

الاستعمالات:

الفترة الآمنة (أيام)	نسبة الاستعمال / ٢٠	الآفة	المحصول
١٥	٤٥ - ٣٠ مل	يرقات حرشفيّة الأجنحة، الخفافس، التربس، المن.	ملفووف، زهرة، بطاطا، بندورة، بصل، ثوم، كوسا، فاصولياء، شمام، بطيخ.
١٥	٥٠ - ٤٠ مل	دودة التفاح، عنة الشمار، ذبابة الفاكهة، يرقات حرشفيّة الأجنحة، الخفافس، دودة ثمار العنب، ثاقبات الأوراق، اليق الدقيق.	العنبر، البرتقال، الليمون، اللمونتينا، المندرين، البوولي، التفاح، الأجاص، الدرادق، المشمش، الخوخ، النكتارين، الكرز، اللوز
١٥	٤٠ - ٥٠ مل	البيض، الدييدان القارضة، المن، ذبابة القمح.	القمح.
١٥	٤٥ - ٣٠ مل	الحفار.	الذرة.

تحذير:

عدم استعمال المبيد على المحاصيل غير المذكورة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الآمان قبل عملية القطاف.
السمية على النبات: غير سام للنباتات في ظروف استعماله الطبيعية ولكن قد يحدث تأثير سلبي للقطن والصلبيات
وبعض أشجار الفاكهة عند رشه بجرعات عالية، قد يسبب الصدا لبعض أصناف التفاح.

فترة تحرير دخول الحقل المرشوش: يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على آخر معاملة رش.

قابلية الخلط: قابل للخلط مع معظم المبيدات الحشرية المعروفة ما عدا مجموعة البيرناباكريل والمركبات القلوية
وينصح بعمل تجربة خلط صغيرة قبل ٢٤ ساعة من الرش.

* للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والت柳يرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.