

فابكو

المجموعة:

Diphenyl Ether

فيتال-٦٠%

مبيد عشبي زراعي سام

مركز معلق



مبيد عشبي جهازى اختياري يستخدم قبل الانبات لمكافحة الأعشاب الحولية عريضة الأوراق وبعض النجيليات على المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمالات.

التركيب: كل لتر يحتوي على :

٦٠% و / ح (مادة فعالة)

اكلونيفين

الخواص:

فيتال-٦٠% : مبيد عشبي جهازى اختياري ، يستخدم لمكافحة الأعشاب الحولية عريضة الأوراق وبعض النجيليات ويسبب اصفرار وتبيض الاغصان الصغيرة للأعشاب.

فيتال-٦٠% : يمتص بشكل أساسي عن طريق البادرات أثناء نموها وذلك عبر طبقة المبيد المتواجدة على سطح التربة، لذلك يعمل المبيد من خلال تأثيره على البادرات وليس الجذور وبالتالي فإن درجة الحرارة ورطوبة التربة لا تؤثر على المبيد **فيتال-٦٠%** وقت الاستعمال.

فيتال-٦٠% : فترة الأثر المتبقي من شهرين الى ثلاثة أشهر.

فيتال-٦٠% : يجب تطبيقه بشكل متجانس ومنظم على سطح التربة.

الاستعمالات :

المحصول	الأعشاب	معدل الاستعمال	عدد المعاملات خلال الموسم	موعد الاستعمال	آخر موعد لتطبيق المبيد
البطاطا الفاصولياء البازيلاء الفول	القبا الحولى، أبوركية، عصا الراعى، عنب الذئب الأسود، الدبيقة، حشيشة القزاز، ركب الجمال، المدادة، العليق، القريص، رجل الحمام، البابونج، السلجم.	٣٠٠ مل / دونم	١	يجب تطبيق المبيد قبل انبات الأعشاب والمحصول.	بعد تحضير الانلام، وقبل اقل من أسبوع من ظهور براعم البطاطا
				يجب تطبيق المبيد بعد البذار وقبل انبات المحصول.	بعد البذار وقبل انبات المحصول

تحذير :

- لا يستعمل المبيد إلا على المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمالات.
- يجب ان يتم تطبيق المبيد **فيتال-٦٠%** مرة واحدة خلال الموسم.
- للحصول على أفضل النتائج، يجب تطبيق المبيد **فيتال-٦٠%** بشكل متجانس ومنظم على سطح التربة.
- يجب معايرة آلة الرش قبل الاستعمال.

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

ارشادات :

- لا يتم استخدام المبيد فيتال-٦٠ بعد انبات المحصول.
- يجب المحافظة على التحريك المستمر لمحلول الرش لحين الانتهاء من المعاملة.
- تجنب انجراف محلول الرش للمحاصيل المجاورة، وذلك لان المبيد فيتال-٦٠ قد يسبب حساسية لمحصول الشمندر والصليبات.
- اذا تم استخدام المبيد فيتال-٦٠ بعد انبات المحصول وكانت الظروف البيئية غير مناسبة (رطوبة عالية، درجة حرارة منخفضة) فقد يحدث تلف للمحصول.
- يجب استخدام المبيد فيتال-٦٠ قبل انبات المحصول وبعد وقت قصير من الحفر وتجهيز التربة.
- يجب تحضير التربة والاتلام بشكل مناسب ورشها بمبيد الأعشاب بشكل مناسب ومتجانس.
- التربة المعدنية والتربة العضوية تقلل فترة الاثر المتبقي للمبيد فيتال-٦٠ .
- يؤثر المبيد فيتال-٦٠ على الأعشاب حيث تبدأ الاعراض بظهور اللون المكثف، ثم تتحول الى الاصفرار على البراعم والاغصان الصغيرة ومن ثم يؤدي الى توقف نمو الأعشاب وموتها.
- المبيد فيتال-٦٠ لا يمتص عن طريق الجذور، وبالتالي فانه لا يعتمد على درجة حرارة ورطوبة التربة وقت الاستعمال.
- لا يؤثر المبيد فيتال-٦٠ على الاعشاب عريضة الاوراق التي تنمو من الفسيلة الجذرية.
- بعد المعاملة بالمبيد فيتال-٦٠ يجب تجنب اجراء أي معاملة للتربة بأي شكل من الاشكال (ميكانيكية او غيرها) لان ذلك سيققل من مستوى مكافحة الأعشاب الضارة.

تأثير على المحاصيل الأخرى:

- لا يسبب حساسية للبطاطا، عباد الشمس، البازلاء، وقد يسبب حساسية على محصول الشمندر والصليبات، بالإضافة الى الحبوب والذرة عند استخدام الجرعة العالية.

فترة الانتظار لزراعة المحاصيل اللاحقة (من تطبيق المبيد الى زراعة المحاصيل اللاحقة):

- يتم اتباع الدورة الزراعية حسب المعتمد، ولكن شرط ان يتم حراثة التربة على عمق ١٠ سم قبل البذار للمحاصيل الأخرى.
- يمكن زراعة بذور الفت، الشعير، القمح، الشيلم، الشمندر، الخردل، عباد الشمس، الذرة، البازلاء، الفاصولياء، وفول الصويا بعد ٣ أسابيع من استخدام المبيد فيتال-٦٠ ، شريطة ان يتم حرث التربة على عمق ١٠ سم قبل البذار.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش :

- يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٤٨ ساعة على اخر معاملة رش

قابلية الخلط:

- غير قابل للخلط مع المبيدات الاخرى.

* تراكيب واسماء تجارية أخرى: أكلوفاب-٦٠%.