

فايكو

المجموعة:

Phthalamide

كربتات - ٥٠%



مبيد فطري زراعي سام

مسحوق قابل للبلل

مبيد فطري علاجي ووقائي ذو تأثير فعال على الأمراض الفطرية التي تصيب المحاصيل الزراعية الواردة في جدول الاستعمالات.

التركيب: كل كغم يحتوي على :

٥٠% و/و (مادة فعالة)

كابتان

الخواص :

كربتات - ٥٠% : مبيد يستخدم لمقاومة الأمراض الفطرية التي تصيب الأجزاء الخضرية ولمقاومة آفات التربة.

كربتات - ٥٠% : يقاوم عدد كبير من الأمراض الفطرية التي تصيب المزروعات مثل التبغ، التفاف الأوراق، اللبغات المبكرة والمتأخرة وأمراض النبات في الأشغال.

كربتات - ٥٠% : مبيد ذو سمية منخفضة لذوات الدم الحار.

كربتات - ٥٠% : يمكن استخدامه لمعاملة البذور ضد الأمراض الفطرية التي يمكن أن تصيبها.

الاستعمالات :

يمكن سقاية النبات بمحلول المبيد أو رشه على الأجزاء الخضراء في النبتة حسب النسب التالية :

المحصول	المرض	نسبة الاستعمال ٢٠ / لتر ماء	طريقة الاضافة	معدل الاستعمال لكل موسم	فترة الأمان (أيام)
التفاح، الاجاص.	الجرب، العفن، التبغ، التلطح.	٢٠ - ٤٠ غم	رش	التفاح: ٧٢٦ غم / ٢٠ لتر ماء	٧
المشمش، الدراق، الخوخ، الكرز.	العفن البني، تبغ، الأوراق، الجرب.	٤٠ - ٥٠ غم	رش	المشمش: ٢٨٤ غم / ٢٠ لتر ماء الدراق: ٧٢٦ غم / ٢٠ لتر ماء الخوخ: ٦١٢ غم / ٢٠ لتر ماء الكرز: ٣١٨ غم / ٢٠ لتر ماء	٣
العنب.	موت الاقارع.	٤٠ غم	رش	٢٧٢ غم / ٢٠ لتر ماء	٧
	العفن الأسود، البياض الزغبي.	٤٠ - ٥٠ غم	يرش قبل الازهار فقط وبعد الازهار وبداية العقد، ويكرر الرش بعد ٢-٣ أسابيع عند الإصابة بالبياض الزغبي		
الفراولة.	العفن الرمادي، تبغ الأوراق.	٩٠ - ١٣٥ غم	ترش عن بداية النمو في الربيع ويكرر اسبوعياً.	٥٤٤ غم / ٢٠ لتر ماء	٣
الخيار، القرع، الكوسا.	انثراكنوز، الجرب.	٦٥ - ١٣٥ غم	يرش عند بداية الإصابة ويكرر الرش كل ٥ - ٧ أيام .	---	٣
البندورة.	انثراكنوز، اللبحة المبكرة والمتأخرة، تبغ الأوراق الرمادي، تبغ الأوراق السبتوري.	٤٠ - ٨٠ غم	يرش عند بداية الإصابة ويكرر الرش كل ٧ - ١٠ أيام .	---	٣

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

فابكو

المحصول	المرض	نسبة الاستعمال / ٢٠ لتر ماء	طريقة الاضافة	معدل الاستعمال لكل موسم	فترة الأمان (أيام)
بروكلي، الملفوف، الزهرة، الباذنجان، بازيلاء، الفلفل، البندورة، الورد.	ذبول الأشتال، عفن الجذور.	١٢٥ - ٢٢٥ غم / ١٠٠ م٢	يتم اضافة المبيد للتربة قبل الزراعة على عمق ٨ - ١٠ سم	---	---
نباتات الزينة (القرنفل، الورد).	تبقع الأوراق، اللفحات، التبقع الأسود.	٤٠ - ٤٥ غم	رش النباتات ويكرر كل ٧ - ١٠ أيام عند الضرورة.	---	---

تحذير : عدم استخدام المبيد إلا على المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.

ملاحظة : يمكن استعماله لمعاملة بذور البازيلاء لمقاومة أمراض التربة بنسبة ١٦٠ غم كريتان - ٥٠% / ٥٠٠ مل ماء / ١٠٠ كغم بذار.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش :

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على آخر معاملة رش.

قابلية الخلط :

غير قابل للخلط مع المركبات القلوية وزيوت الرش وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش.

* تراكيب اخرى: كريتان - ٨٠ % WP .

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.