

فابكو

المجموعة:
Methoxyacrylate⁽¹⁾
Triazole⁽²⁾

كرنشر-٤،٥١٪

مبيد فطري زراعي سام
مركز ملقي



مبيد فطري جهازي له تأثير وقائي وعالجي لمكافحة العديد من الأمراض الفطرية على عدد كبير من المحاصيل الزراعية (الخضروات، أشجار الفاكهة) .

التركيب : كل لتر يحتوي على :

٦٪ ح / مادة فعالة

ازوكسي ستروبين⁽¹⁾

٨٪ ح / مادة فعالة

فلوتريافول⁽²⁾

الخواص :

كرنشر-٤،٥١٪ : ذو تأثير مزدوج وفردي لمكافحة عدد كبير من الأمراض الفطرية التي اكتسبت مناعة من المبيدات الأخرى.

كرنشر-٤،٥١٪ : مبيد فطري جهازي لمكافحة الأمراض الفطرية (تبقع الأوراق، الانشراكتونز، الاعفان، اللفحات، البياض الذهبي، البياض الدقيق، اللطخات، الصدأ)

الاستعمالات:

الفترة الآمنة (أيام)	ملاحظات	معدل الاستعمال / لتر ماء	المرض	المحصول
٢١	- العفن البني ولحمة الإزهار: تتم المعاملة عند ٥٪ من التهير. - يتم الرش لاول مرره بشكل وقائي عندما تصيب الظروف ملائمة لحدوث الاصابة وقبل الاصابه - يعاد الرش بعد ٧-١٢ يوم	٧ - ١٢ مل	تبقع الأوراق الالترناري، انشراكتونز، العفن البني، اللحمة المتاخرة، الجرب، ت نقب الأوراق	اللوز.
٧	- يتم الرش لاول مرره عندما تصيب الظروف ملائمة لحدوث الاصابة وقبل الاصابه بشكل وقائي - يعاد الرش بعد ٧ أيام	٧ - ١٢ مل	التبغ الأسود، تبقع الأوراق، البياض الدقيق، الصدأ الابيض	البروكلي، الملفوف، الخردل، الزهرة
٧	- يتم الرش عند بداية ظهور المرض ويعاد الرش كل ١٠-٧ أيام - في حال الاصابة الشديدة يتم استخدام الجرعة الاعلى.	٧ - ١٢ مل	الصدأ، انشراكتونز، تبقع الأوراق، لحمة الأوراق	الذرة.
٧	- البياض الذهبي يتم المعاملة بشكل وقائي كل ٥-٥ أيام - العفن: تتم المعاملة الاولى بمرحلة ٣-١ ورقات - يعاد الرش بعد ١٤-٧ يوم - يتم الرش لاول مرره عندما تصيب الظروف ملائمة لحدوث الاصابة وقبل الاصابه بشكل وقائي ويعاد الرش كل ١٤-٧ يوم	٧ - ١٢ مل	انشراكتونز، العفن، البياض الذهبي، لحمة الساق، لحمة الأوراق، تقرحات، البياض الدقيق، تبقع الأوراق	خيار، بطيخ، شمام، القرع، الكوسا.

* للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

فایک

الفترة الأمان (أيام)	ملاحظات	معدل الاستعمال / لتر ماء	المرض	المحصول
١٤	البياض الدقيقى: تبدأ المعاملة عندما تكون طول الأغصان ٢٥-٣٥ سم . - يتم الرش لاول مره بشكل وقائي عندما تصبح المظروف ملائمة لحدوث الاصابة وقبل الاصابه وبعد الرش ١٤ - ٢١ يوم	٩ - ٧ مل	العفن الأسود، تبعق الأوراق، البياض الدقيقى، البياض الزبغي.	العنب
٧	البياض الزبغي: يتم الرش لاول مره بشكل وقائي عندما تصبح المظروف ملائمة لحدوث الاصابة وبعد الرش بعد ٧ أيام. - يتم الرش لاول مره بشكل وقائي عندما تصبح المظروف ملائمة لحدوث الاصابة وقبل الاصابه وبعد الرش ٧ - ١٤ يوم	٩ - ١٢ مل	تبعق الأوراق الالتئاري، انثراكتوز، البياض الزبغي، الفحمة المتأخرة، الفحمة المبكرة، البياض الدقيقى، تبعق الأوراق، الصدأ	الحسن، الbcdونس، السبانخ
١٤	- العفن البني وتلفحة الازهار، تتم المعاملة عند ٥-٦٪ من التثمير . - يتم الرش لاول مره بشكل وقائي عندما تصبح المظروف ملائمة لحدوث الاصابة وقبل الاصابه وبعد الرش بعد ١٢.٧ يوم	٨ - ١٢ مل	تبعق الأوراق الالتئاري، انثراكتوز، عفن النمايا، فحمة ^١ الازهار، لفحة الأوراق، صدأ ^٢ الأوراق، البياض الدقيقى، الجرب.	الدرارق، المشمش، النتكاريين، الخوخ، الكرز
٧	- يتم الرش لاول مره بشكل وقائي عندما تصبح المظروف ملائمة لحدوث الاصابة وقبل الاصابه وبعد الرش بعد ٧ أيام	٧ - ١٢ مل	البياض الدقيقى، انثراكتوز، العفن	الفراولة
٧	- يتم الرش لاول مره بشكل وقائي عندما تصبح المظروف ملائمة لحدوث الاصابة وقبل الاصابه وبعد الرش بعد ٧ - ١٠ يوم	٦ - ١٢ مل	انثراكتوز، البياض الدقيقى، العفن الأسود، الفحمة المبكرة، الفحمة المتأخرة، التبعق السيتوري، التقع الزاوي	البنينورة
٧	- يتم الرش لاول مره بشكل وقائي عندما تصبح المظروف ملائمة لحدوث الاصابة وقبل الاصابه وبعد الرش بعد ٧ - ١٤ يوم	٦ - ١٢ مل	انثراكتوز، تبعق الأوراق، البياض الدقيقى	الباذنجان، الفلفل، البايميا
٣٠	- يتم الرش لاول مره بشكل وقائي عندما تصبح المظروف ملائمة لحدوث الاصابة وقبل الاصابه فترة الأمان: ٣٠ يوم للحبيوب، ١٥ يوم للتبغين، ٧ أيام للاعلاف	٦ - ١٠ مل	الصدأ، البياض الدقيقى، تبعق الأوراق السيتوري، المطحاط	القطم

تحذير:

- لا يستعمل المبيد إلا على المحاصيل الواردة في جدول الاستعمالات مع مراعاة فترات الأمان قبل عملية القطف.
 - يستخدم مرتين في السنة على محصول القمح، ٦ مرات في السنة على محصول العنب، و٤ مرات في السنة على باقي المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمالات.
 - ان بعض أنواع التفاح حساس للمبيد كرينثـ٤، ٥١ لذلك يجب الاحتياط ويجب الا يستعمل عند وجود خطير انحراف الرش الى محصول التفاح المجاورة لانه قد يسبب حروق شديدة.

فتره تحریم دخول الحقل المرشوش:

يجب عدم دخول الحقل المروش قبل مرور ١٢ ساعة على آخر معاملة رش .

قابلية الخلط: قابل للخلط مع معظم المبيدات وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش.

* أسماء تجارية أخرى: هنتر - ٤٥١٪ .

- للحصول على معلومات عن الأسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.