



كلومافاب-٤٨%



مبيد عشبي زراعي سام
مركز قابل للاستحلاب

مبيد عشبي اختياري يستعمل قبل الانبات لمكافحة الاعشاب الحولية رفيعة و عريضة الاوراق على المحاصيل الزراعية الواردة في جدول الاستعمالات.

التركيب: كل لتر يحتوي على :

٤٨% و / ح (مادة فعالة)

كلومازون

الخواص:

كلومافاب-٤٨% : مبيد عشبي اختياري يمتص عن طريق الجذور والاوراق وينتقل خلال النبات من داخل الى خارج الاوراق.

كلومافاب-٤٨% : يستعمل قبل الانبات لمكافحة الاعشاب الحولية رفيعة وعريضة الاوراق.

كلومافاب-٤٨% : مبيد عشبي لمكافحة الاعشاب على المحاصيل التالية (الخيار، البطيخ، القرع، الكوسا، الفاصولياء، البطاطا، التبغ).

الاستعمالات :

المحصول	الاعشاب	معدل الاستعمال (لتر / هكتار)	ملاحظات
الخيار، البطيخ، القرع، الكوسا	عنب الديب، البقلة، ركب الجمل، المداد APPLE OF PERU (NICANDRA PHYSALODES) POTATO WEED (GALINSOGA PARVIFLORA)	١,٠ - ٠,٥	- قبل نقل اشتال القرعيات : لا تتم المعاملة بمبيد كلومافاب-٤٨%. - يتم استخدام الجرعة الاقل حيث بعض انواع القرعيات قد تكون حساسة للمبيد كلومافاب-٤٨%. - يمكن خلط المبيد كلومافاب-٤٨% مع مبيدات اخرى لمكافحة الاعشاب بعد الانبات.
الفاصولياء		١,٠ - ٠,٥	- يستعمل قبل انبات الاعشاب. - يمكن خلط المبيد كلومافاب-٤٨% مع مبيدات اخرى لمكافحة الاعشاب بعد الانبات.

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

فابكو

المحصول	الأعشاب	معدل الاستعمال (لتر / هكتار)	ملاحظات
البطاطا	عنب الديب، البقلة، ركب الجمل، المداد APPLE OF PERU (NICANDRA PHYSALODES) POTATO WEED (GALINSOGA PARVIFLORA)	٠,٥	- يستعمل قبل انبات الاعشاب لمكافحة الاعشاب العريضة. - قد يسبب حساسية لمحصول البطاطا عند استخدام المبيد بعد انبات المحصول. - يمكن خلط المبيد كلوماقاب-٤٨ % مع مبيدات اخرى لمكافحة الاعشاب بعد الانبات.
التبغ قبل نقل الاشتال.		٢,٠-١,٠	- يستخدم قبل نقل الاشتال او قبل نمو الاعشاب. - يتم استخدام الجرعة الاعلى في حال توقع وجود كثافة للاعشاب.

دونم = ١٠٠٠ م^٢

فترة الانتظار لزراعة المحاصيل اللاحقة (من تطبيق المبيد الى زراعة المحاصيل اللاحقة)

معدل الاستعمال	المدة (شهر)	١٥	١٢	٩	٦	٣	٠
٠,٥ لتر / هكتار	البطاطا، الخيار، البطيخ، القرع، الكوسا، الفاصولياء، التبغ	---	---	المحاصيل الاخرى.	القمح، الشعير، الشوفان، البصل، اللفت، الشيلم.	---	
١ لتر / هكتار	البطاطا، الخيار، البطيخ، القرع، الكوسا، الفاصولياء، التبغ	---	المحاصيل الاخرى.	المحاصيل الاخرى.	القمح، الشعير، الشوفان، البصل، اللفت، الشيلم.	---	
٢ لتر / هكتار	الخيار، البطيخ، القرع، الكوسا، الفاصولياء، التبغ	البطاطا	---	---	القمح، الشعير، الشوفان، البصل، اللفت، الشيلم.	المحاصيل الاخرى.	

تعزيز : لا يستعمل المبيد إلا على المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمالات.

ارشادات :

- يتم تخفيف المبيد بكمية من الماء لا تقل عن ١٥٠-٤٠٠ لتر/هكتار.
- يفضل عمل تجربة رش مصغره وذلك لان بعض المحاصيل حساسه للمبيد كلوماقاب-٤٨ %.
- يمنع الري قبل الحصاد.

فترة تجريم دخول الحقل المرشوش : يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٤٨ ساعة على اخر معاملة رش.

قابلية الخلط : غير قابل للخلط مع غيره من المبيدات (الحشرية، الفطرية، الأسمدة ومنظمات النمو).

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.