

فابكو

المجموعة :
Aryloxyphenoxy-
propionate

كويزوفاب-٨، ١٠٪

مبيد عشبي زراعي سام
مركز قابل للاستحلاب



مبيد عشبي جهازي اختياري يمتص عن طريق سطح الأوراق وينتقل من خلال أوعية اللحاء والخشب ويتراكم في الأنسجة المرستيمية.

التركيب: كل لتر يحتوي على :

٨، ١٠٪ ح (مادة فعالة)

كويزوفوب-ب-ايتيل

الخواص :

كويزوفاب-٨، ١٠٪ : مبيد عشبي جهازي اختياري يمتص عن طريق سطح الأوراق وينتقل من خلال أوعية اللحاء والخشب ويتراكم في الأنسجة المرستيمية.

كويزوفاب-٨، ١٠٪ : مبيد عشبي اختياري يستعمل بعد الإنبات لمكافحة الأعشاب الحولية والمعمرة على المحاصيل الواردة ذكرها في جدول الاستعمالات.

الاستعمالات : مكافحة الأعشاب الشتوية – Boom Spryer

المحصول	العشاب	عمر الاعشاب	معدل الاستعمال	فترة الأمان	فترة التحريم لحيوانات الرعي	ملاحظات
الشمندر	الشيلم البري، الشويعرة	عندما تكون الأعشاب في مرحلة ٣ أوراق.	٢٨ – ٣٥ مل /دوئم	١٤ يوم	---	- يرش في مرحلة النمو النشط للأعشاب.
المفوف				٩ أسابيع	---	- تستخدم الجرعة الأعلى عندما تكون الأعشاب كثيفة أو عند بداية مرحلة الأشطاء.
الجزر				١٠ أسابيع	---	
الزهرة	الشعير بري، قمح بري.	عندما تكون الأعشاب في مرحلة ٣ أوراق.	٢٣ مل /دوئم	١٤ يوم	---	- يرش في مرحلة النمو النشط للأعشاب.
الحمص				١٢ اسبوع	٢٨ يوم	
البرسيم				---	١٤ يوم	
الخيار				١٤ يوم	---	- يرش في مرحلة النمو النشط للأعشاب.
الفول				١٢ اسبوع	٢٨ يوم	- تستخدم الجرعة الأدنى عندما تكون الأعشاب قليلة الكثافة أو عندما تكون الأعشاب في مرحلة ١-٣ أوراق.
البازيلاء	الشوفان البري	عندما تكون الأعشاب في مرحلة ٣ أوراق.	١٢ – ٢٣ مل /دوئم	٩ أسابيع	٢٨ يوم	
البطيخ				٩ أسابيع	---	
البصل				١٨ اسبوع	---	- تستخدم الجرعة الأعلى عندما تكون الأعشاب كثيفة أو عند بداية مرحلة الأشطاء.
البطاطا				١٠ أسابيع	---	
اليقطين				٩ أسابيع	---	
الفجل				٢١ يوم	---	
البندورة				٤ أسابيع	---	

دوئم = ١٠٠٠ م

مكافحة الأعشاب الصيفية – Boom Spryer

المحصول	الأعشاب	عمر الأعشاب	معدل الاستعمال	فترة الأمان	فترة التحريم لحيوانات الرعي	ملاحظات
الشمندر	النجيل	عندما تكون الأعشاب في مرحلة ٢-٤ أوراق.	٤٦ مل / دونم	١٤ يوم	----	- يرش في مرحلة النمو النشط للأعشاب.
الملفوف				٩ أسابيع	----	- استخدم هذه الجرعة فقط عندما يكون عمر النجيل اقل من شهرين ومتفرع من بذور.
الزهرة				١٤ اسبوع	----	
الجزر	حشيشة جونسون	عندما تكون الأعشاب في مرحلة ٢ ورقة الى مرحلة ٣ أوراق.	٤٦-٦٩ مل / دونم	١٠ أسابيع	----	- يرش في مرحلة النمو النشط للأعشاب.
الخيار				١٤ يوم	----	- تستخدم الجرعة الاعلى عندما تكون الاعشاب كثيفة أو عند بداية مرحلة الاضطاء.
فاصولياء				٥ أسابيع	٢٨ يوم	
خضراء				٩ أسابيع	----	
البطيخ				١٨ اسبوع	----	
البصل				١٠ أسابيع	----	
البطاطا				٩ أسابيع	----	
اليقطين				٢١ يوم	----	
الفجل				١٢ اسبوع	٢٨ يوم	
فول الصويا				٩ أسابيع	١١ أسبوع	
دوار الشمس				٤ أسابيع	----	
البندورة						

دونم = ١٠٠٠ م^٢

تحذير : يمنع استعمال المبيد على المحاصيل غير الواردة في جدول الاستعمالات.

تنبيهات:

- يجب معايرة آلة الرش قبل البدء بالمعالجة.
- يفضل اضافة مادة ناشرة ومبللة مثل **سوبر سيرفكس** عند رش المبيد.
- يجب عدم رش المحاصيل وهي تحت تأثير الضغط المتسبب عن الطقس البارد الشديد، الامراض، الجفاف، الغمر بالماء.
- يجب عدم رش الأعشاب وهي تحت تأثير الضغط المتسبب عن الظروف المناخية (الجفاف، الغمر بالماء) او ان تكون الأعشاب غير نشيطة النمو عندما تكون الأعشاب تحت الضغط تتأثر بنسبة قليلة بالمبيدات، وان النتائج تكون قتل غير مكتمل للأعشاب ويكون تأثير المبيد على الحشائش فقط.
- لا يستخدم المبيد عند ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة.
- يجب اعادة الرش اذا سقطت الامطار خلال ٣ ساعات.
- يجب عدم زراعة محاصيل الحبوب الا بعد مرور ١٨ اسبوع على آخر معاملة.
- يوصى باستخدام مضخة خاصة لرش المبيد واذا تعذر ذلك فيجب غسل المضخة جيداً قبل استعمالها مرة أخرى.
- يجب عدم زراعة محاصيل الحبوب الا بعد مرور ١٨ اسبوع على آخر معاملة.
- استخدم ما بين ٥٠ و ١٠٠ لتر من محلول الرش الجاهز / هكتار
- اذا كانت الأعشاب كثيفة يوصى بزيادة الحجم إلى ١٥٠ لتراً من محلول الرش الجاهز / هكتار.
- يجب عدم رش المبيد عند وصول المحصول الى مرحلة الورقة الحقيقية الخامسة لكل من محاصيل (الخيار، اليقطين والبطيخ).
- استخدم المرشات ذات الفوهات المخروطية المجوفة عند (210-350 kPa) لإعطاء توزيع متساوٍ للرش

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش : يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على آخر معاملة رش.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش لحيوانات الرعي:

يمنع رعي أو تغذية الحيوانات على محصولي البرسيم والبازيلاء إلا بعد مرور ١٤ يوم على آخر معاملة رش اما بقية المحاصيل إلا بعد مرور ١٢ اسبوع على آخر معاملة رش.

قابلية الخلط:

قابل للخلط مع مبيدات الأعشاب الخاصة بمكافحة الأعشاب العريضة وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش.