

فابكو

المجموعة:
Hydroxybenzonitrile

نوجرين - ٢٨٪

مبيد عشبي زراعي سام
مركز قابل للاستحلاب



مبيد عشبي انتقائي يعمل بالملامسة مع تأثير جهازى بسيط لمكافحة الأعشاب الحولية عريضة الأوراق بعد الإنبات في حقول القمح، الشعير، الذرة الصفراء، البصل، الثوم، الفصّة، الأراضي الصناعية وغير المزروعة.

التركيب: كل لتر يحتوي على :

بروموكسنيل اوكتانوييت

٢٨٪ و/ح (مادة فعالة)

الخواص:

نوجرين-٢٨٪: مبيد عشبي انتقائي ذو خاصية جهازية بسيطة يتمتن عن طريق المجموع الخضري في مواقع محدودة للانتقال.

نوجرين-٢٨٪: مبيد عشبي يعمل عن طريق تثبيط عملية التمثيل الضوئي الضرورية في النبات لانتاج الغذاء.
نوجرين-٢٨٪: مبيد عشبي انتقائي لمكافحة الأعشاب الحولية عريضة الأوراق بعد الإنبات في حقول القمح، الشعير، الذرة الصفراء، البصل، الثوم، الفصّة، الأراضي الصناعية وغير المزروعة.

نوجرين-٢٨٪: مبيد متوسط السمية للثدييات وسام للأسماك وغير سام للنحل.

الاستعمالات :

المحصول	الأعشاب	معدل وموعد الاستعمال لتر/ دونم	فترة الأمان
القمح، الشعير	الأعشاب الحولية	١٥٠-٢٠٠ مل/ دونم (٢٠-٤٠ لتر ماء/ دونم). يستعمل بعد الإنبات حتى مرحلة تكوين الغلاف الساق وبدء مرحلة التفرع.	٢٤ يوم
الذرة الصفراء	عريضة الأوراق	١٥٠-٢٠٠ مل/ دونم (٢٠-٤٠ لتر ماء/ دونم). يستعمل عندما يكون المحصول في طور ٢-٨ أوراق.	٢٤ يوم
الثوم	مثل: الأقحوان،	٢٣٠-٣٠٠ مل/ دونم (٢٠-٤٠ لتر ماء/ دونم). يستعمل بعد إنبات المحصول وقبل وصوله إلى ٣٠ سم طول.	٣، ٥ شهر
البصل	دقيقة، ضرس	١٥٠-٢٠٠ مل/ دونم (٢٠-٤٠ لتر ماء/ دونم). يستعمل عندما يكون المحصول في طور ٢-٥ أوراق.	شهر
الفصّة	العجوز.	١٥٠-٢٠٠ مل/ دونم (٢٠-٤٠ لتر ماء/ دونم). يستعمل عندما يصل طول الأعشاب إلى ٥ سم.	شهر
الأراضي الصناعية والأراضي غير المزروعة		١٥٠-٢٠٠ مل/ دونم (٢٠-٤٠ لتر ماء/ دونم). يستعمل عند إنبات الأعشاب وفي مراحل النمو النشط.	----

دونم = ١٠٠٠ م^٢

تحذير : عدم استخدام المبيد إلا على المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

ارشادات:

- يجب معايرة آلة الرش قبل البدء بالمكافحة.
- يجب رش الأعشاب قبل وصولها لمرحلة الستة أوراق.
- يجب أن يكون الرش متساويا ومتجانسا في كل المناطق المراد معاملتها.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش:

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٤٨ ساعة على آخر معاملة رش.

فترة تحريم الرعي للحيوانات:

يجب عدم رعي أو تغذية الحيوانات قبل مرور ٦٠ يوما على آخر معاملة رش.

قابلية الخلط :

قابل للخلط مع معظم المبيدات العشبية وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش.