

فايكو

المجموعة:

Diphenyl Ether

هدف - ٢٤٪

مبيد عشبي زراعي سام
مركز قابل للإستحلاب



التركيب: كل لتر يحتوي على :

اوكسي فلورفن

الخواص:

- هدف - ٢٤٪ : مبيد عشبي اختياري يعمل عن طريق الملامسة يلتصق بشكل أسرع عن طريق الأجزاء الخضرية منه عن طريق الجذور.
- هدف - ٢٤٪ : فعالية المبيد تعتمد بشكل أساسي على درجة الحرارة وشدة الضوء وللحصول على أطول فترة فعالية يجب رش المبيد في درجات الحرارة المنخفضة وبشدة ضوء منخفضة أيضا.
- هدف - ٢٤٪ : ذو سمية منخفضة للتدييات وغير سام للنحل.

الاستعمالات :

المحصول	موعد الرش	نسبة الاستعمال	فترة الامان
البصل، الثوم	عندما يكون النبات في مرحلة ٣-٤ ورقات الى ما قبل بدء مرحلة التجذير	١٥٠ - ٢٠٠ مل / دونم	٣٠ - ٥٦ يوم
الثوم	يمكن الرش قبل ظهور الاعشاب	١٠٠ - ١٥٠ مل / دونم	٣٠ - ٥٦ يوم
اشجار الفاكهة والعنب	قبل ظهور الاعشاب. يستعمل كعامل وقائي في آخر فصل الخريف وحتى بداية فصل الشتاء	٣٠٠-٤٠٠ مل/دونم ويستعمل التركيز الأعلى في فصل الربيع	٣٠ - ٥٦ يوم
الحمضيات	بعد ظهور الاعشاب	٤٠٠-٥٠٠ مل/دونم	٣٠ - ٥٦ يوم
الزهرة، الملفوف (اشتال)	يستعمل المبيد على التربة المحضرة جيدا قبل نقل الاشتال إليها بيوم إلى ثلاثة أيام وتزرع نباتات جيدة بطول ١٢-١٥ سم.	٢٠٠-٣٠٠ مل/دونم تستعمل النسب العليا عند وجود أعشاب معمرة.	٣٠ - ٥٦ يوم

دونم = ١٠٠٠ م^٢

تحذير : عدم استخدام المبيد إلا على المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.

ملاحظة : بالنسبة للبصل يمكن أن تظهر بقع بيضاء على أوراق البصل بعد استعمال المبيد ولكن هذا لا يؤثر على نمو النبات.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش : يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة من آخر معاملة رش.

فترة تحريم الرعي للحيوانات:

يمنع دخول الحيوانات الرعوية إلى الأماكن المعاملة كما يمنع استخدام الأعشاب المعاملة لتغذيتها لمدة ٢١ يوم.

قابلية الخلط : غير قابل للخلط مع المبيدات الأخرى.