

فابك

المجموعة:

Hydroxybenzonitrile

هوک -٪ ٢٥

مبيد عشبي زراعي سام

مركز قابل للاستحلاب



مبيد عشبي متخصص يعمل باللامسة ويستعمل بعد زراعة المحاصيل الزراعية للقضاء على العديد من الأعشاب الحولية عريضة الأوراق كما هو موضح في جدول الاستعمالات.

التركيب: كل لتر يحتوي على :

٢٥٪ وح (مادة فعالة)

ايوكتينيل اوكتانويت

الغواص:

هوک -٪ ٢٥ : مبيد عشبي يعمل باللامسة يمتص عن طريق المجموع الخضري وينتقل الى الأجزاء السفلية للنبات ويعيق عملية التمثيل الضوئي للأعشاب.

هوک -٪ ٢٥ : مبيد عشبي اختياري وله تأثير جهازي لمكافحة الأعشاب الحولية عريضة الأوراق.

الاستعمالات:

المحصول	نسبة الاستعمال	مرحلة نمو المحصول
البصل، الثوم، الكراث	٢٠٠ - ٢٨٠ مل / دونم	مرحلة ٣ اوراق
القمح، الشعير	١٦٠ - ٢٠٠ مل / دونم	مرحلة ٣ اوراق الى استطاله الساق، ويفضل خلال مرحلة الاشطاء.
	دونم = ١٠٠٠ م²	

تحذير: عدم استخدام المبيد إلا على المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمالات.

ارشادات :

- يجب معايير آلة الرش قبل الاستعمال.

- يوصى باستعمال نسبة الاستعمال الأعلى من المبيد في حالة الاصابة الشديدة بالأعشاب.

- لا تستعمل آلة الرش الملوثة بهذا المبيد لأي أغراض أخرى إلا بعد غسلها بالمنظفات جيداً.

- حتى تتحقق المكافحة المثلث للأعشاب، استعمل هوک -٪ ٢٥ على الأعشاب النامية بشكل نشيط وعند إنبات العشب والنباتات في مرحلة ٣ أوراق.

فترة تعريض دخول العقل المرشوش: يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٤٨ ساعة من آخر معاملة رش.

قابلية الخلط : قابل للخلط مع معظم المبيدات العشبية الأخرى لكن غير قابل للخلط مع الأسمدة السائلة والمبيد ٤-٤-د والذي يكون تحضيره بشكل سائل ذاتي في الماء وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش.

* اسماء تجارية أخرى : هوکس - EC ٪ ٢٥

* للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية المكتبة.