

فابك

المجموعة:

Sulfonylurea

هيريفلورين - ٤٨%

مبيد عشبي زراعي سام
مركز قابل للاستحلاب



مبيد عشبي متخصص للقضاء على الأعشاب الحولية الرفيعة والعريةة الأوراق يستعمل قبل زراعة المحاصيل الزراعية كما انه يقضي على بذور الأعشاب.

التركيب: كل لتر يحتوي على :

٤٨٪ و/ح (مادة فعالة)

ترايفلورالين

الخصائص:

هيريفلورين - ٤٨٪: مبيد عشبي اختياري يستعمل قبل زراعة المحاصيل.

هيريفلورين - ٤٨٪: مبيد ذو فعالية عالية لمكافحة الأعشاب الحولية الرفيعة والعريةة الأوراق.

هيريفلورين - ٤٨٪: ليس له اثر متبقى كما لا يوجد له تأثير سلبي على المحصول الثاني الذي يزرع بعد المعاملة.

الاستعمالات:

موعد الاستعمال	معدل الاستعمال	طريقة الاستعمال	مجالات الاستعمال
يستعمل قبل عملية الزراعة المباشرة (بذور) او التشتت وذلك بـ ٦ أسابيع على الأقل وكذلك يمكن رشه بعد الزراعة بـ ٩٠ يوم بشرط أن لا يلامس المبيد المحاصيل المزروعة.	يضاف بنسبة ٢٥-١٢٠ مل / دونم تداب في ٤٠-٢٠ لتر ماء.	يستعمل قبل الزراعة وذلك بخلطه مع التربة بمعدل ٤٠-٢٠ لتر محلول الرش / دونم على عمق ١٥-٨ سم.	مبيد عشبي يستخدم قبل الزراعة للمحاصيل التالية: (زراعة الشتل): فلفل، بندورة، التبغ، زهرة، ملفوف، بروكلي. (زراعة البذور): قوافل الصويا، بامية، جزر، لفت الشمندر السكري (شتل) (يرش بين خطوط الزراعة بعد ظهور ٦-٤ أوراق حقيقية)

دونم = ١٠٠٠ م²

تحذيرات :

- لا يستعمل المبيد إلا على المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمالات.

- لا يستعمل قبل مضي ١٢-٦ شهر على المحاصيل الحساسة : الشمام، البطيخ، الخيار، السبانخ، الذرة، البندورة (بذور)، الفلفل (بذور)، زهرة (بذور)، ملفوف (بذور)، الشمندر السكري (بذور).

فترة تعرييم دخول الحقل المرشوش:

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٤٨ ساعة على آخر معاملة رش.

فترة تعرييم الرعي للحيوانات:

يجب عدم دخول المنطقة المعاملة بالمبيد لمدة ٧ أيام على الأقل من آخر معاملة رش.

قابلية الخلط: يفضل عدم خلطه مع أي مبيد آخر.

* للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.