



مبيد عشبي زراعي سام مصحوق قابل للبلل

مبيد عشبي جهازى اختياري متخصص يستعمل قبل وبعد زراعة المحاصيل الزراعية للقضاء على الأعشاب الحولية الرفيعة والعريضة الأوراق كما أنه يمنع نمو بذور الأعشاب.

التركيب: كل كغم يحتوي على :

٨٠٪ و/و (مادة فعالة).

ديورون

الخواص:

هيريون - ٨٠٪ : مبيد عشبي جهازى اختياري من مجموعة يوريا، يعمل عن طريق المجموع الخضري للنبات.
هيريون - ٨٠٪ : مبيد ذو فعالية عالية لمكافحة الأعشاب الحولية الرفيعة والعريضة الأوراق.
هيريون - ٨٠٪ : يستخدم قبل زراعة المحاصيل الزراعية وبعد الزراعة مع الالتزام بالتوصيات الخاصة في جدول الاستعمالات.

الاستعمالات :

المحصول	الأعشاب	طريقة ووقت الاستعمال	معدل الاستعمال
التفاح والأجاص (الأشجار أقل من عمر سنة)	عرف الديك، أعشاب الشعير، أعشاب الفناء، عشبة رجل الغراب، كيس الراعي، عشبة غنينا، الخردل البري، الشيلم، الخرفيش، الجعضيض، الفجل البري، اللفت البري.	رشة واحدة في الشتاء. أولا رشة أولى بعد الحصاد ورشة ثانية في الربيع. لا يستخدم تحت أصناف أشجار الاجاص المقزمة.	٤٥٠ غم / دونم ٢٣٠ غم / دونم
الاسبرجس (الهلين)	الأعشاب العريضة الأوراق وبعض الأعشاب الحولية.	لا يرش على الأشاتال الصغيرة. يتم الرش قبل نمو الأشواك على المهاميز.	١٧٠ - ٢٣٠ غم / دونم
الموز		تجنب ملامسة المبيد للنبات.	٢٣٠ - ٤٥٠ غم / دونم (يستخدم من ٢٠ - ٥٠ لتر ماء/دونم)
بابايا		لا تستخدم على الأشجار بعمر أقل من ٩ شهور	٢٢٥ - ٤٥٠ غم / دونم
الحمضيات (عمر سنة على الأقل)		يرش قبل نمو الأعشاب في الخريف والربيع. لا يضاف عامل مبلل إذا كان هناك احتمالية لوصول المبيد الى المجموع الخضري للنبات.	٢٣٠ - ٤٥٠ غم / دونم (يستخدم حتى ٤٠٠ لتر ماء/ دونم)
العنب		يرش تحت الأغصان. يرش قبل النمو الموسمي للأعشاب.	٢٢٥ - ٤٥٠ غم / دونم
بذور الأعشاب		تستخدم جرعة أقل في السنة التالية.	٣٣٧ - ٣٧٠ غم / دونم
الترمس		قبل رش البذور وقبل نموها.	١٢٤ غم / دونم

• للحصول على معلومات عن الاسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

فابكو

الاستعمالات :

المحصول	الأعشاب	طريقة ووقت الاستعمال	معدل الاستعمال
قصب السكر	معظم الأعشاب العريضة الأوراق والأعشاب النجيلية في مراحل نموها المبكرة.	- يرش بمعدل عالي قبل نمو محصول قصب السكر. - يتم سقي المحصول خلال ١٠ أيام من الرش.	٢٢٥-٤٥٠ غم / دونم
القمح، الشعير والشوفان	هندباء، خردل بري، عشبة الجليد، إكليل الجبل، الخشخاش، الزعفران، الشوك، حميض، اللفت البري.	لا يرش في المرحلة المبكرة من تكون الأشتاء.	٥٦ غم/دونم
جوانب الطرق والأراضي غير المزروعة	الأعشاب الحولية والمعمرة والأعشاب العريضة الأوراق (عشبة نبات السعد، عشبة جونسون، نبات العليق).	- لا يرش خلال موسم الجفاف. - إذا تمت سقاية الأعشاب بعد الرش سيكون التأثير أفضل حيث ينتقل المبيد ليصل للجذور.	المرشات الظهرية: يستخدم من (٥٠٦ - ٢٠٢٥) غم/دونم يستخدم من ٤٠-٨٠ لتر ماء/دونم المرشات الآلية: يستخدم من ٥٠٠-٢٠٠٠ غم/دونم (يستخدم على الأقل ٢٠٠ لتر ماء / دونم)
المساحات الصغيرة		باستخدام المرشة الظهرية.	١٠٠ غم في ١٥ لتر ماء / ٢٠ م

دونم = ١٠٠٠ م^٢

تحذير : لا يستعمل المبيد إلا على المحاصيل المذكورة في الجدول مع اتباع المعدلات والإرشادات الموصى بها.

إرشادات :

- يجب معايرة آلة الرش قبل الاستعمال.
- يمكن إضافة مادة مبللة حسب المعدلات الموصى بها في الجدول عند مكافحة الأعشاب النامية.
- يتم رش المبيد والتربة رطبة مالم ينصح بغير ذلك.
- للحصول على نتيجة أفضل ترش الأعشاب وهي في قمة نموها الخضري.
- ينصح بعدم الرش في حال توقع سقوط أمطار غزيرة خلال ٦ ساعات.
- ينصح بعدم رش المحاصيل المتعرضة للظروف القاسية وغير الجيدة مثل الجفاف.
- لا تخزن محلول الرش لأكثر من ٢١ ساعة.
- يجب تحريك محلول الرش بشكل مستمر.
- قد تسبب الأمطار الغزيرة ضررا للنباتات عند سقوطها بعد المعاملة في التربة الفقيرة بالمادة العضوية ويجب على المستخدم أن يُقدّر الضرر الممكن حدوثه في حالة سقوط الأمطار الغزيرة
- تجنب ملامسة رذاذ المبيد لأوراق المحاصيل والفاكهة

فترة تحريم دخول الحيوانات للرعي : لا يسمح بالرعي إلا بعد ٧٠ يوم من معاملة الحقل بالمبيد.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش :

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على آخر معاملة رش.

قابلية الخلط :

قابل للخلط مع المبيدات العشبية، ولكن يفضل عمل تجربة خلط مبدئية قبل استخدامه مع أي من المبيدات التالية: (Metsulfuron Methyl, Paraquat (200g or 250g), Diquat, Trifluralin, 2,4-D Amine and Ester and MCPA Herbicides).

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.