

فابكو

المجموعة :

Oxime Carbamate

أجرينيت -٪٢٤

مبيد حشري زراعي سام جداً
مركز قابل للذوبان



مبيد حشري جهازي يستعمل للقضاء على جميع الآفات الحشرية التي تصيب المحاصيل الزراعية
الوارد ذكرها في جدول الاستعمالات.

التركيب : كل لتر يحتوى على :

٪٢٤ و/ح (مادة فعالة)

ميثوميل

الخواص :

أجرينيت -٪٢٤ : مبيد صاعق سريع وقاتل للحشرات الوارد ذكرها في جدول الاستعمالات.

أجرينيت -٪٤ : فتك يقاوم الحشرات في جميع أنظارها مثل البيوض واليرقات .

أجرينيت -٪٤ : يقضى على الحشرات التي يصعب مقاومتها مثل الحشرات وديدان الشمار وصانعات الأنفاق ويقضي أيضاً على الحشرات التي اكتسبت مناعة ضد المبيدات الفسفورية والبایترويدية .

أجرينيت -٪٤ : يتماز بسرعة تحلله في الطبيعة مما يقلل فترة الأمان المطلوبة على الخضروات وأشجار الفاكهة .

أجرينيت -٪٤ : ليس له أي أثر سلبي على البيئة لسرعة تحلله .

الاستعمالات :

نسبة الاستعمال / لترماء ٢٠	الآفة	المحصول
فتره الأمان (أيام)		
٧	١٥ - ١١ مل	ديدان الشمار والأوراق.
٧	١٥ - ١١ مل	الديدان الخضراء، ديدان الأوراق، المن، التربس .
٧	١٥ مل	ديدان الأوراق، المن ، التربس.
٧	١٥ مل	ديدان الأوراق، المن، التربس.
٧	١٥ مل	الديدان القارضة، حفار الذرة، المن ، الخنافس .
٧	١٥ - ١٠ مل	المن الأخضر والأسود، صانعات الأنفاق ، حفار الساق، البسيلاء، نفاثات الأوراق، التربس، النطاطات.
٧	١٥ - ١١ مل	ديدان العنقود، نطاطات الأوراق.
--	١٥ - ١١ مل	نفاثات الأوراق، صانعات الأنفاق، البق، ديدان الأوراق، نطاط الأوراق، المن ، التربس .
		نباتات الزينة (الحقول المفتوحة، البيوت ال بلاستيكية).

تعانير :

لا يستعمل المبيد على المحاصيل غير الواردة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطاف.

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

فابكو

فتررة تحرير دخول الحقل المرشوش:

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٧٢ ساعة على اخر معاملة رش .

إرشادات :

- يجب استعمال مرشاشات أرضية ذات ضغط منخفض أثناء الرش ويستعمل اجرنيت - ٦٤% في المزارع التجارية ولا يفضل استعماله في الحدائق المنزلية.
- اماً خزان الرش حتى ربعه او نصفه بماء ثم أضف الكمية الموصى بها من اجرنيت - ٦٤% وابدا بالتحريك (استعمل طرقاً ميكانيكية) ثم أكمل تعبئة الخزان حتى نهايته ومن ثم ابدأ الرش.
- استعمل النسب الموصى بها عند ظهور الحشرات، ويتم الرش على فترات تمتد ٥ - ٧ أيام حسب الحاجة.
- في حالة وجود اكثراً من نسبة للاستعمال، استعمل النسب المنخفضة على النباتات التي تكون في أطوار نموها الأولى أو عندما تكون الإصابات الحشرية خفيفة .

قابلية الخلط :

قابل للخلط مع معظم المبيدات الفطرية والحسوية المعروفة وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش.

• للحصول على معلومات عن الإساعات الأولية والتحذيرات راجع المفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.