

فابكو

المجموعة:  
Juvenile  
hormone mimic

أجروكسين-١٠٪

مبيد حشري سام  
مركز قابل للإستحلاب



مبيد حشري ذو تأثير جديد ومطور بحيث يؤثر على التكاثر والتطور الجيني للحشرات وكذلك يوقف عملية الانسلاخ.

التركيب : كل لتر يحتوي على :

بايريبروكسفين

الخواص :

اجروكسين-١٠٪ : مبيد حشري جديد ومطور يعمل على تثبيط نمو الحشرات وبالتالي القضاء عليها.

اجروكسين-١٠٪ : منظم نمو الحشرات IGR بحيث يؤثر على التكاثر والتطور الجيني للحشرات وكذلك يوقف عملية الانسلاخ.

اجروكسين-١٠٪ : خفيف السمية للثدييات وذو تأثير طفيف على البيئة.

اجروكسين-١٠٪ : يمكن استخدامه في برنامج المكافحة IPM.

الاستعمالات :

| المحصول                          | الآفة                         | معدل الاستعمال<br>٢٠ / لتر من الماء | ملاحظات   | عدد مرات<br>التطبيق / محصول     | الجرعة الأعلى<br>للتطبيق /<br>٤٠٠ لتر /<br>السنة الواحدة | فترة ما بين<br>التطبيقات<br>(أيام) | فترة الأمان<br>(أيام) |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------|
| الخرشوف                          | العث، الذبابة البيضاء         | ١١,٨-١٤,٧ مل                        | يطبق على السطح العلوي للأوراق وينقل إلى السطح السفلي للورقة. يطبق مع المعدات في كمية مناسبة من الماء لتغطية كاملة.      | لا يطبق أكثر من مرتين في الموسم | ٥٩١,٤ مل   | ١٤                                 | ٧                     |
| الهلون                           | الذبابة البيضاء               | ١١,٨-١٤,٧ مل                        | لا يطبق أكثر من ثلاث مرات في الموسم   | لا يطبق أكثر من مرتين في الموسم | ٥٩١,٤ مل   | ١٤                                 | ٧                     |
| الموز                            | الذبابة البيضاء               | ١٩,٢-٢٣,٦ مل                        | لا يطبق أكثر من مرتين في الموسم   | لا يطبق أكثر من مرتين في الموسم | ٥٩١,٤ مل   | ١٤                                 | ٧                     |
| الملقوف، اللبث، الزهرة، البروكلي | الذبابة البيضاء               | ١١,٨-١٤,٧ مل                        | بيدا التطبيق عندما تصل الذبابة البيضاء الى مستوى الحد الحرج. تحت الضغط الشديد استخدم النسبة الأعلى في التشرة.           | لا يطبق أكثر من مرتين في الموسم | ٤٧٣ مل   | ١٤                                 | ١٣                    |
| الثوم، البصل                     | التريس                        | ١١,٨ مل                             | لنعم التريس: يطبق كمية مناسبة من الماء لتغطية كاملة. بيدا التطبيق عندما يصل التريس الى الحد الحرج.                      | لا يطبق أكثر من مرتين في الموسم | ٩٤٦,٣ مل   | ١٤                                 | ٧                     |
| التوت البري                      | دودة الفاكهة، الحشرات القشرية | ٢٣,٦ مل                             | يطبق كمية مناسبة من الماء لتغطية كاملة. يطبق دودة الفاكهة: يطبق عندما تبدأ مرحلة وضع البيض ومرة أخرى عند تساقط البتلات. | لا يطبق أكثر من مرتين في الموسم | ٩٤٦,٣ مل   | ١٤                                 | ٧                     |

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

# فابكو

| المحصول  | الأفة   | معدل الاستعمال<br>/ ٢٠ لتر من الماء | ملاحظات  | عدد مرات<br>التطبيق /<br>محصول  | الجرعة الأعلى<br>/ للتطبيق<br>/ ٤٠٠ لتر/<br>السنة الواحدة | فترة ما بين<br>التطبيقات<br>(أيام) | فترة الأمان<br>(أيام) |
|--|---|-------------------------------------|--|---------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------|
| اليومين،<br>الجريب<br>فروت،<br>الكمكوات،<br>المدلين،<br>اليوملي،<br>البرتقال       | الحشرات القشرية   | ٢٣,٦ مل                             | يطبق بكمية مناسبة من الماء لتغطية كاملة. يطبق في أي وقت قبل أن تصل أعداد الحشرة القشرية لمرحلة حرجة في مرحلة بعد التفقيص. التطبيق في الجيل الثاني أو الثالث للحشرة يمكن أن يؤدي إلى أعداد كبيرة للحشرات الميتة على الثمار الجاهزة للقطف.             | —                               | ٧٦٨,٩ مل  | ٢١                                 | ١                     |
|  | صناعات الانفاق،<br>الذبابية البيضاء،<br>الذبابية السوداء    | ١٤,٨ مل                             | يطبق بكمية مناسبة من الماء لتغطية كاملة. وضع كمية مناسبة للماء لحجم الشجرة. يطبق عندما تبدأ الأفة في الظهور وقبل أن تصل لمرحلة حرجة. التغطية الشاملة جيدة للمكافحة.  | —                               | ٢٩٥,٧ مل  | ١٤                                 |                       |
| القطن  | الذبابية البيضاء  | ١٤,٧-١١,٨ مل                        | يطبق بكمية مناسبة من الماء لتغطية كاملة. تبدأ لمكافحة الـ عندما تصل الذبابية البيضاء الى مستويات الحد الحرج.   | يطبق مرة واحدة في الموسم الواحد | ٢٩٥,٧ مل  | ١٤                                 | ٢٨                    |
|  | الذبابية البيضاء  | ١٤,٧-١١,٨ مل                        | مستويات الحد الحرج.  | لا يطبق أكثر من مرتين في الموسم | ٥٩١,٤ مل  | ١٤                                 | ٧                     |
| البادنجان،<br>اليامية،<br>الفلفل   | الذبابية البيضاء،<br>المن،<br>الدودة القرن،<br>مودة الملفوف | ١١,٨-٨,٨ مل                         | يطبق في خزان خليط مع معادات أرضية لتغطية كاملة ٥٦٧,٨-٩٤,٦ لتر من الماء للقدان.   | لا يطبق أكثر من مرتين في الموسم | ٤٧٣ مل  | ١٤                                 | ٣                     |
|  | الذبابية البيضاء،<br>المن،<br>التربس،<br>مودة الحشد         | ١١,٨-٨,٨ مل                         | يطبق في خزان خليط مع معادات أرضية لتغطية كاملة. يطبق عند أول ظهور لحشرة الذبابية البيضاء البالغة على النبات الصغير. برنامج الوقاية منتصف وآخر الموسم للذبابية البيضاء لتضع الغير اعتيادي للفاكهة: يطبق في خزان خليط مع معادات أرضية للتغطية الشاملة. | لا يطبق أكثر من مرتين في الموسم | ٤٧٣ مل  | ١٤                                 | ١٤                    |
| العنب<br>العثة   | الحشرات القشرية،<br>العثة                                   | ٢٣,٦ مل                             | يطبق بكمية مناسبة من الماء لتغطية كاملة. يطبق المبيد في حالة السكون المتأخر. استخدام الزيت. لا تستخدم الزيت عند خروج القشريات من البيض.  | لا يطبق أكثر من مرتين في الموسم | ٩٤٦ مل  | ١٤                                 | ٢١                    |
| اللافندر،<br>الزعرور<br>الأخضر   | الذبابية البيضاء  | ١٤,٧-١١,٨ مل                        | تطبق في العدات الأرضية مع كمية كافية من الماء لتغطية كاملة. الحد الأدنى من الماء ٧٥,٧ لكل فدان. يبدأ التطبيق الأرضي عندما تصل أعداد الذبابية البيضاء للحد الحرج.   | لا يطبق أكثر من مرتين في الموسم | ٥٩١ مل  | ١٤                                 | ١                     |
| الكرفس،<br>الخنس،<br>السبانخ،<br>اليقطين،<br>البطاطا<br>البحلو،<br>اللفت،<br>الفجل | الذبابية البيضاء  | ١٤,٧-١١,٨ مل                        | يطبق في العدات بكمية كافية من الماء لتغطية كاملة. يبدأ التطبيق عندما تصل أعداد الذبابية البيضاء للحد الحرج.  | لا يطبق أكثر من مرتين في الموسم | ٥٩١ مل  | ١٤                                 | ١٤                    |

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

# فابكو

| المحصول                                       | الآفة                            | معدل الاستعمال<br>/ ٢٠ لتر من الماء | ملاحظات  | عدد مرات<br>التطبيق /<br>محصول  | الجرعة الأعلى<br>للتطبيق /<br>٤٠٠ لتر/<br>الستة الواحدة | فترة ما بين<br>التطبيقات<br>(أيام) | فترة الأمان<br>(أيام) |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------|
| الفاصولياء،<br>اليازلاء،<br>الترمس،<br>العنبد | الذبابة البيضاء                  | ١٤,٧-١١,٨ مل                        | الموسم المبكر لبرنامج الذبابة البيضاء؛ يطبق مع معدات أرضية بكمية مناسبة من الماء لتغطية كاملة. يطبق إما في وقت السكون أو السكون المتأخر. يمكن استعمال المبيد بالإضافة إلى الزيت. في حالة وجود كميات كبيرة من الحشرات القشرية استخدم النسبة الأعلى. | لا يطبق أكثر من مرتين في الموسم | ٥٩١ مل  | ١٤                                 | ٧                     |
| الزيتون                                       | الحشرة القشرية<br>السوداء        | ٢٣,٦-١٩,٢ مل                        | يطبق مع المعدات الأرضية بكمية كافية من الماء لحجم الشجرة، التغطية الشاملة مهمة جدا في عملية مكافحة. يطبق خلال فترة السكون أو السكون المتأخر ويمكن استخدام الزيت.   | لا يطبق أكثر من مرتين في الموسم | ٩٤٦,٣ مل  | ١٤                                 | ٧                     |
| المراعي                                       | نطاط الأوراق،<br>الجراد          | ١٤,٧-١١,٨ مل                        | يبدأ التطبيق عندما تصل الآفات لستويات حرجة.  | لا يطبق أكثر من مرتين في الموسم | ٥٩١ مل  | ١٤                                 | —                     |
| التفاح،<br>السفرجل،<br>الأسكندنيا             | العثة<br>القمع لثافات<br>الأوراق | ٢٣,٦-١٩,٢ مل                        | تنطبق على المعدات الأرضية وتغطية شاملة. يتم التطبيق الأول بالقرب من سقوط البتلات. والتطبيق الثاني بعد ١٤ إلى ٢١ يوما بالنسبة إلى مكافحة لثافات الأوراق؛ يطبق المبيد في مرحلة سقوط البتلات.   | لا يطبق أكثر من مرتين في الموسم | ٩٤٦ مل  | ١٤                                 | ٤٥                    |
|   | الحشرات القشرية                  |                                     | يطبق خلال فترة السكون أو السكون المتأخر ويمكن استخدام الزيت.   |                                 |   |                                    |                       |
|   | المن، صانعات<br>الأنفاق          | ٢٣,٦-١٤,٧ مل                        | صانعات الأنفاق؛ يتم مكافحة في طور الطيران للتحكم في الجيل الأول والثاني. المن؛ يطبق عند ظهور حشرات المن لأول مرة، ولكن قبل أن تصل إلى الأعداد الحرجة.  |                                 |   |                                    |                       |
| الأجاص  | البيسلا                          | ٢٣,٦-١٩,٢ مل                        | يطبق بالمعدات الأرضية بالإضافة إلى الزيت. ضع تطبيقا واحدا خلال فترة السكون المتأخر. أو عمل تطبيقتين من السكون المتأخر خلال مرحلة البتلات. للسيطرة الموسمية على بيسلا الأجاص، استخدم مبيد حشري موصى به لهذا الاستخدام.                              | لا يطبق أكثر من مرتين في الموسم | ٩٤٦ مل  | ١٤                                 | ١٤                    |
|   | الحشرات القشرية                  |                                     | يطبق مع المعدات الأرضية بكمية كافية من الماء لحجم الشجرة، التغطية الشاملة مهمة جدا في عملية مكافحة. يطبق خلال فترة السكون أو السكون المتأخر ويمكن استخدام الزيت.   |                                 |   |                                    |                       |
|   | العثة<br>قمح:<br>لثافات الأوراق  |                                     | تنطبق على المعدات الأرضية وتغطية شاملة. يتم التطبيق الأول بالقرب من سقوط البتلات. والتطبيق الثاني بعد ١٤ إلى ٢١ يوما بالنسبة إلى مكافحة لثافات الأوراق؛ يطبق المبيد في مرحلة سقوط البتلات.   |                                 |   |                                    |                       |

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

## فايكو

| المحصول   | الآفة            | معدل الاستعمال<br>/ ٢٠ لتر من الماء | ملاحظات   | عدد مرات<br>التطبيق /<br>محصول              | الجرعة الأعلى<br>للتطبيق /<br>٤٠٠ لتر /<br>الستة الواحدة | فترة ما بين<br>التطبيقات<br>(أيام) | فترة الأمان<br>(أيام) |
|---|------------------|-------------------------------------|---|---|--|------------------------------------|-----------------------|
| الرمان  | الذبابة البيضاء  | ٢٣,٦-١٩,٢ مل                        | يطبق في المعدادات بكمية كافية من الماء لتغطية كاملة. يبدأ التطبيق عند وصول الذبابة البيضاء للحرج.       | لا يطبق أكثر من ثلاثة تطبيقات للموسم الواحد | ١٤١٩,٥ مل  | ١٤                                 | ١٤                    |
| الزنجبيل،<br>البطاطا،<br>الفضل،<br>البطاطا<br>الجلوة،<br>الكركم،<br>اللفت | الذبابة البيضاء  | ١١,٨ مل                             | يطبق في المعدادات بكمية كافية من الماء لتغطية كاملة. يبدأ التطبيق عند وصول الذبابة البيضاء للحرج.       | لا يطبق أكثر من تطبيقين للموسم الواحد       | ٤٧٣ مل   | ١٤                                 | ٧                     |
| المشمش،<br>الكرز،<br>الوخوخ،<br>التكتارين،<br>البرقوق،<br>الدراق.         | الحشرات القشرية. | ٢٣,٦-١٩,٢ مل                        | يطبق خلال فترة السكون أو السكون المتأخر ويمكن استخدام الزيت بكمية ماء كافية بتغطية شاملة لنبات المعامل. | لا يطبق أكثر من ثلاثة تطبيقات للموسم الواحد | ١٤١٩,٥ مل  | ١٤                                 | ١٤                    |
| الفراولة  | الذبابة البيضاء  | ١٤,٨ مل                             | يطبق في المعدادات بكمية كافية من الماء لتغطية كاملة. يبدأ التطبيق عند وصل الذبابة البيضاء للحرج.        | لا يطبق أكثر من تطبيقين للموسم الواحد.      | ٥٩١,٥ مل   | ٣٠                                 | ٣                     |
| اللوز   | الحشرات القشرية  | ٢٣,٦-١٧,٢ مل                        | يطبق خلال فترة السكون أو السكون المتأخر ويمكن استخدام الزيت بكمية ماء كافية بتغطية شاملة لنبات المعامل. | لا يطبق أكثر من مره للموسم الواحد.          | ٤٧٣,١ مل   | —                                  | ٢١                    |
| الأفوكادو،<br>الجوافة،<br>المانجو،<br>الباييا                             | الحشرات القشرية  | ٢٣,٦ مل                             | يطبق خلال فترة السكون أو السكون المتأخر ويمكن استخدام الزيت بكمية ماء كافية بتغطية شاملة لنبات المعامل. | لا يطبق أكثر من تطبيقين للموسم الواحد.      | ٩٤٦,٣ مل   | ١٤                                 | ١٤                    |

### فترة تحريم دخول المنطقة المعاملة:

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على آخر تطبيق.

### قابلية الخلط:

قابل للخلط مع معظم المبيدات المعروفة ما عدا القلوية منها، وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل التطبيق.

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.