

فابكو

الجموعة :

Methoxyacrylate⁽¹⁾
Triazole⁽²⁾

أزوكسيفن - ٣٢,٥ %

مبيد فطري زراعي سام / مركز معلق



مبيد فطري جهازي له تاثير وقائي وعلاجي لمقاومة العديد من الامراض الفطرية على الخضراوات وأشجار
الفاكهة... وغيرها من المحاصيل .

التركيب: كل لتر يحتوي على :

٢٠% و/ح (مادة فعالة)

أزوكسي سترويين⁽¹⁾

١٢,٥% و/ح (مادة فعالة)

دايفينوكونازول⁽²⁾

الخواص :

أزوكسيفن - ٣٢,٥% : مبيد فطري جهازي ذو تاثير علاجي ووقائي للعديد من الأمراض الفطرية.
أزوكسيفن - ٣٢,٥% : له سمية منخفضة وليس له تاثير على الثدييات وامن على البيئة والأعداء الحيوية.
أزوكسيفن - ٣٢,٥% : يستخدم في برامج مكافحة المتكاملة (IPM).

الاستعمالات :

المحصول	المرض	معدل الاستعمال / ٢٠ لتر ماء	فترة الأمان (أيام)
البطاطا	اللفحة المبكرة وتثقبات الأوراق	١٠-١٥ مل	١٤
البندورة والفلفل	اللفحة المبكرة وتثقبات الأوراق البياض الدقيقي	١٠-١٥ مل	٧ ٣
القرعيات	البياض الدقيقي ، تثقبات الأوراق والانثراكنوز	١٠-١٥ مل	٣
العنب	البياض الدقيقي تثقبات الأوراق البياض الزغبي وموت الافرع	١٠-١٥ مل ١٠ مل	١٤
الدراق	البياض الدقيقي ، تثقبات الأوراق، تثقبات الأوراق	١٠-١٥ مل	١٤
الخيار	البياض الدقيقي والبياض الزغبي	٥,٠ مل	٣

تحذير :

- تجنب استعمال المبيد على المحاصيل غير الواردة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترة الأمان قبل القطف.
- ان بعض انواع التفاح حساسه لأزوكسيفن - ٣٢,٥% لذلك يجب الاحتياط ويجب الا يستعمل عند وجود خطر انحراف
الرش الى محاصيل تفاح مجاورة لانه قد يسبب حروق شديدة .

فترة تعريم دخول الحقل المرشوش :

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على آخر معاملة رش .

قابلية الخلط :

قابل للخلط مع معظم المبيدات ويفضل استعمال المبيد فوراً بعد الخلط، وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش.

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.