

فايكو

الجموعة :

Organophosphate

التراسيدين . ٤٠٪



مبيد حشري زراعي سام

مركز قابل للاستحلاب

مبيد حشري غير جهازي يعمل بالملامسة وعن طريق المعدة فعال في القضاء على الآفات التي تصيب أشجار الفاكهة والبطاطا والحمضيات.

التركيب : كل لتر يحتوي على :

٤٠٪ و/ح (مادة فعالة)

ميثيداثيون

الخواص :

التراسيدين - ٤٠٪ : مبيد حشري غير جهازي فعال في القضاء على العديد من الحشرات التي تصيب أشجار الفاكهة والحمضيات والبطاطا.

التراسيدين - ٤٠٪ : يعمل بالملامسة وعن طريق المعدة.

الاستعمالات :

المحصول	الآفة	معدل الاستعمال ٢٠ / لتر ماء	ملاحظات	فترة الأمان (أيام)
الحمضيات	الحشرات القشرية الذبابة البيضاء، المن، السوس، حفار الأوراق، ذبابة الفاكهة، من القطن الأخضر.	٣٠ مل ٢٠ - ٢٥ مل	بعد ٥ - ٦ أسابيع من سقوط البتلات يجب تكرار التطبيق عند الحاجة.	٢١
العنب، اللوز، الدراق، المشمش، التكاثرين، الخوخ	الحشرات القشرية، البق الدقيقي، من القطن الأخضر، صانعات الأنفاق، السوس، الحلم الأحمر، الذبابة البيضاء.	٢٠ مل ١٥ - ٢٠ مل	يجب التطبيق عند بدء الإصابة	١٤ ٢١
البطاطا	المن	١٥ - ٢٠ مل	يتم التطبيق عند ظهور الحشرات. يتم تكرار الرش عند الحاجة.	٢١

تحذير :

لا يستعمل المبيد على المحاصيل غير الواردة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترة الأمان قبل عملية القطف.

فترة تعريم دخول الحقل المرشوش :

- يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٤٨ ساعة على آخر معاملة رش.
- يمنع الرعي في المناطق المرشوشة أو استخدام بقايا المحاصيل المعاملة للرعي

قابلية الخلط : قابل للخلط مع معظم المبيدات المعروفة ما عدا القلوية مثل الكبريت، الكلس أو النحاس لأنها تقلل من فعاليتها ويفضل عمل تجربة خلط مصغرة قبل ٢٤ ساعة من الرش.

* أسماء تجارية أخرى : سوبرالتراسيدين - ٤٠٪ EC ، أقروسيدين - ٤٠٪ EC .

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.