

فابك

المجموعة:

Triazole

أوبليت - ١٢,٥%

مبيد فطري زراعي سام / مركز معلق



مبيد فطري جهازي ذو تأثير وقائي وعلاجي لمكافحة العديد من الأمراض الفطرية مثل البياض الدقيق، الأداء، التلطخات، التبقعات التي تصيب المحاصيل الزراعية المذكورة في جدول الاستعمالات.

التركيب: كل لتر يحتوي على :

١٢,٥٪ (مادة فعالة) و/ج

ايبوكسي كونازول

الغواص:

أوبليت - ١٢,٥٪: مبيد فطري جهازي ذو تأثير وقائي وعلاجي لمكافحة الأمراض الفطرية التالية: تبقعات الساق، البياض الدقيق، الأداء، التلطخات، تخطيط أوراق الشعير، تبقع الأوراق، عفن الطرف الأسود، عفن الطرف الأصفر التي تصيب المحاصيل الزراعية المذكورة في جدول الاستعمالات.

الاستعمالات:

الفترة الآمنة (أيام)	موعد وعدد مرات الرش	معدل الاستعمال / لترماء	المرض	المحصول
٢٥	رشة واحدة (طول النبات ٣٠ - ٣٢ سم) يرش عند ظهور المرض ويكرر الرش عند ظهورها مرة أخرى	١٥ - ١٠ مل ١٠ مل ١٠ - ٥ مل ١٠ - ٧,٥ مل ١٠ - ٧,٥ مل ١٠ مل	تبقعات الساق. البياض الدقيق. الأداء. التلطخات. الأداء. التطيخات، تخطيط أوراق الشعير.	القمح، الشعير القمح الشعير
	يرش عند ظهور المرض ويعاد الرش بعد ٣ - ٤ أسابيع	١٠ - ٧,٥ مل	تبقع الأوراق، البياض الدقيق، الصاد.	الشمندر السكري
٣	---	٦ - ٨ مل	عفن الطرف الأسود، عفن الطرف الأصفر.	الموز

تحذير:

عدم استخدام المبيد إلا على المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطاف.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش: يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على آخر معاملة رش.

قابلية الخلط: قابل للخلط مع مركبات المورفولين ومركبات مجموعة البنزيميدازول (كاربنداميل، بينوميل، ثيابيندازول) وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش.

* للحصول على معلومات عن الآسماقات الأولية والتحذيرات راجع المفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.