



## فابكوه

المجموعة:  
Sulfonylurea

# اوسكار -٪٧٥

مبيد عشبي زراعي سام  
مسحوق قابل للبلل

مبيد عشبي يستعمل بعد الإنبات لمكافحة الأعشاب عريضة الأوراق في حقول القمح والشعير والشوفان والذرة.

التركيب: كل كغم يحتوي على :

ترايبينيرون - ميثيل ٪٧٥ و / و (مادة فعالة)

الخواص:

اوسكار -٪٧٥ : مبيد عشبي يعمل عن طريق المجموع الخضري من مجموعة سلفونيل يوريا.

اوسكار -٪٧٥ : يمتص بسرعة وبشكل فعال عن طريق المجموع الخضري وعن طريق الجذور وينتقل بسهولة في النبات.

اوسكار -٪٧٥ : مبيد عشبي يستعمل بعد الإنبات ويكافح الأعشاب عريضة الأوراق في محاصيل القمح والشعير حيث يبدأ تأثير المبيد مباشرة بعد المعاملة، غير أن أمراض المكافحة تظهر بعد حوالي أسبوعين من الرش.

### الاستعمالات:

المحصول	الأعشاب	موعد الاستعمال	معدل الاستعمال
القمح	عين الجمل، فس الكلاب، قزازة، كيسىس الراعي، العشبة القرنفلية (SPURRY CALIFORNIA THISTLE , WILD TURNIP, WILLOW WEEDS.	بعد وصول المحصول لمرحلة الورقتان وقبل وصول مرحلة التبطين.	١٧ غم / هكتار
الشعير	عين الجمل، فس الكلاب، قزازة، كيسىس الراعي، العشبة القرنفلية (SPURRY CALIFORNIA THISTLE , WILD TURNIP, WILLOW WEEDS.	بعد وصول المحصول لمرحلة الورقتان وقبل وصول مرحلة التبطين.	٢٥ غم / هكتار
الشوفان	عين الجمل، فس الكلاب، قزازة، كيسىس الراعي، العشبة القرنفلية (SPURRY CALIFORNIA THISTLE , WILD TURNIP, WILLOW WEEDS.	في حالة الاصابة الشديدة بالاعشاب وحجم وكثافة الاعشاب الكبيرة	٣٥ غم / هكتار
الذرة.	الاعشاب عريضة الأوراق	عندما يكون طول النبات ٣٠-٢٠ سم	١ - ١,٥ غم / دونم ٢ م هكتار = ١٠٠٠ دونم = ٢ م

تحذير: عدم استخدام المبيد إلا على المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمالات.

### طريقة الاستعمال :

- افضل نتائج للمكافحة عن طريق استخدام مرشاشات ارضية على ان لا تقل كمية المياه عن (٣٠٠ - ١٠٠ لتر / هكتار).

- معدلات الاستعمال العالية من المبيد قد تسبب الضرر الكبير لمحصول الذرة لا يستعمل اكثر من ١,٥ غم / دونم.

**ملاحظة:** يمكن اضافة مادة ناشره ولاصقه مثل سوبر سيرفكس لزيادة فعالية المبيد اوسكار -٪٧٥ .

**فتردة الأمان:** يمكن زراعة جميع انواع المحاصيل بعد ٦٠ يوم من المعاملة ولكن يمكن زراعة القمح بأي وقت بعد المعاملة بمبيد اوسكار -٪٧٥ .

\* للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

## **فابكو**

### **الارشادات :**

- يجب معالجة آلة الرش قبل الاستعمال.
- يجب تغطية الأعشاب تغطية كاملة.
- يتم استعمال المبيد مرة واحدة خلال الموسم.
- يجب اخذ كافة الاحتياطات للحيلولة دون حصول تطاير للمبيد للمحاصيل المجاورة أو مصادر المياه.
- لا يتم استخدام المبيد او سكار - % ٧٥ في الحقول المزروعة بالقمح او الشعير مع محاصيل أخرى.
- يمكن زراعة جميع أنواع المحاصيل بعد ٦٠ يوم من المعاملة ولكن يمكن زراعة القمح بأي وقت بعد المعاملة بمبيد او سكار - % ٧٥ .
- يمكن استخدام مادة لاصقة لزيادة فعالية المبيد على الأعشاب المقاومة.
- يجب استعمال محلول الرش خلال ٢٤ ساعة من خلط المبيد وذلك لتجنب تكسره وبالتالي فقدان فعاليته.
- كلما زادت رطوبة التربة وزادت الحرارة زادت فعالية المبيد.
- تجنب المكافحة تحت الظروف غير الجيدة مثل الجفاف، انخفاض خصوبة التربة، التربة المشبعة بالماء، وفي حالة الإصابة بالأمراض والحشرات وكذلك في ظروف محددة مثل الجو البارد الطويل، والفرق الشاسع في درجات الحرارة بين الليل والنهار، ويمكن مشاهدة اصفار الأوراق والتقرم بعد المعاملة.

### **فترة تحرير دخول الحقل المرشوش :**

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على آخر معاملة رش.

### **فترة تحرير الرعي للحيوانات :**

يمنع دخول الحيوانات إلى المنطقة المعاملة إلا بعد مرور ٦٠ يوم على آخر معاملة رش.

### **قابلية الخلط :**

- . قابل للخلط مع معظم المبيدات، ولكن ينصح بعمل تجربة خلط مصفرة قبل الرش.
- ١. عند خلط المبيد او سكار - % ٧٥ مع المبيد فابكور - METRIBUZIN قد يساعد على التقليل من مكافحة الثوم البري
- ٢. عند خلط او سكار - % ٧٥ مع المركبات المحتوية على DICAMBA قد يساعد على التقليل من مكافحة بعض الاعشاب عريضة الاوراق.
- ٣. لا تخلط المبيد او سكار - % ٧٥ مع المركبات المحتوية على DICLOFOP-METHYL لأن ذلك قد يقلل من تأثير المبيد في مكافحة الاعشاب.
- ٤. لا تخلط المبيد او سكار - % ٧٥ مع مبيد ملايثيون لأن ذلك يؤدي الى الحاق ضرر كبير للنبات، كذلك بالنسبة للمبيدات التابعة لمجموعة الفسفور العضوية لأن ذلك يسبب اصفار للنبات وفي الحالات الشديدة يسبب ضرر شديد للمحصول.
- ٥. عند خلط المبيد او سكار - % ٧٥ مع الاسمدة السائلة يجب ان لا تقل درجة حموضة الاسمدة السائلة عن ٣ ويجب عمل تجربة خلط مصفرة قبل الرش.

\* اسماء تجارية أخرى: او سكارد - WP - % ٧٥ .

\* للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.