

فابك

المجموعة:

TETRAMIC ACID

آينيـو - ٤١٠

مبيد حشرى زراعي سام

مركز ملقي



مبيد حشرى جهازى يعمل بشكل رئيسي بواسطة المعدة وله تأثير بالملامسة: بعمل على التأثير على أطوار البيض واليرقات مع تأثيرات اضافية على خصوبة الأطوار البالغة ويستخدم لمكافحة الحشرات على أشجار الفاكهة والخضروات والمحاصيل الأخرى الواردة في جدول الاستعمالات.

التركيب: كل لتر يحتوى على :

١٠٪ و/ح (مادة فعالة)

سبيروفترامات

الخصائص:

آينيـو - ١٠٪ : مبيد جهازى، ينتقل خلال الخشب واللحاء الى جميع الانسجة النباتية بما في ذلك النموات الجديدة والأوراق والجذور.

آينيـو - ١٠٪ : يعمل المبيد عن طريق المعدة ويؤثر على الأطوار الغير بالغة كالبيوض واليرقات كما يؤثر على خصوبة الأطوار البالغة من إناث الحشرات كالذبابة البيضاء والمن.

الاستعمالات:

الفترة الأمان (أيام)	فتررة الأمان بين الرشات (أيام)	موعد الاستعمال	معدل الاستعمال / لتر ماء	الأفة	المحصول
٣	٢١	- يجب أن يخلط المبيد مع مادة نافرة باستثناء الجريب فروت. - الحد الأقصى المسموح به لكل موسم ٧١ مل - لا يستعمل المبيد قبل ١٠ أيام من الإزهار أو خلال الإزهار أو عند اكتمال سقوط البلات	١٢ - ٢٠ مل	الثع، الذبابة البيضاء، البلح، النمندر، البرتقال، اليون، الليمون، الماندرين، البرتقال، اليوملي	الجريب فروت، الليمون، المندر، البرتقال، اليون، الليمون، المندرين، البرتقال، اليوملي
٧	٣٠	- يجب أن يخلط المبيد مع مادة نافرة عالية الجودة وينصح بعمل تجربة رش قبل الاستعمال. - الحد الأقصى المسموح به لكل موسم ٤٤ مل	٧ - ١٢ مل	البق الدقيقي، فيلاوكسر العنبر، الذبابة البيضاء	العنبر، الكيوي
٧	١٤	- لا يستعمل المبيد إلا عند سقوط البلات - الحد الأقصى المسموح به لكل موسم ٨٨,٧ مل	٩ - ١٣ مل	الثع، بسيلا الأجاجص، البق الدقيقي، الذبابة البيضاء	التفاح، اسكندرية، السفرجل، الاجاص
٧	١٤	- لا يستعمل المبيد إلا عند سقوط البلات - الحد الأقصى المسموح به لكل موسم ٨٨,٧ مل	٩ - ١٣ مل	الثع، بسيلا الأجاجص، البق الدقيقي، الذبابة البيضاء	المشمش، التمر، الখوخ، البرقوق
٧	١٤	- لا يستعمل المبيد إلا عند سقوط البلات - الحد الأقصى المسموح به لكل موسم ٧٦,٣ مل	٩ - ١٣ مل	البق الدقيقي، فيلاوكسر، الثع، الذبابة البيضاء	اللون، الكاجو، الكتستناء، الجوز، البندق، الفستق
٣	١٤	الحد الأقصى المسموح به لكل موسم ٨٨,٧ مل	١٢ - ١٥ مل	البيـق الدقيقـي، الحـشرـات القـشـرـية، الـثـعـ، الذـبـابـةـ الـبـيـضـاءـ	الأفوكادـوـ، الـجوـافـةـ، ـماـنجـوـ، ـالـبـابـاـيـاـ

* للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

فابكو

المحصول	الأضة	معدل الاستعمال / لترماء	موعد الاستعمال	فترات الأمان بين المرشات (أيام)	فترات الأمان (أيام)
الباميه، الباذنجان، الفلفل، البنودرة.	المَّ، البسيلا، الذبابة البيضاء	٤ - ٧ مل	الحد الأقصى المسموح به لكل موسم ٣٥,٥ مل	٧	٣
الكرفس، الخس، البقدونس، السبانخ	يرقات الديدان	٤ - ٧ مل	الحد الأقصى المسموح به لكل موسم ٣٥,٥ مل	٧	٣
الحصص، البازلاء، الترمس، الفاصولياء، اللوبيا، العدس.	المَّ، الذبابة البيضاء	٤ - ٧ مل	الحد الأقصى المسموح به لكل موسم ٣٥,٥ مل	٧	٣ البقوليات النضرة والصالحة للأكل. ٧ البقوليات الجافة.
البروكلي، الملفوف، الزهرة	المَّ، الذبابة البيضاء	٤ - ٧ مل	- يجب أن يخلط المبيد مع مادة ناشرة عالية الجودة وينصح بعمل تجربة رش قبل الاستعمال. - الحد الأقصى المسموح به لكل موسم ٣٥,٥ مل	٧	٣
الخرسوف، الزنجبيل، البطاطا، الطاطاط الحلوة، الكركم	المَّ، البسيلا الذبابة البيضاء	٦ - ٧ مل	الحد الأقصى المسموح به لكل موسم ٣٥,٥ مل	٧	٧

تحذير :

- لا يستعمل المبيد إلا على المحاصيل الواردة في جدول الاستعمالات مع مراعاة فترات الأمان قبل عملية القطف.
- لا يستعمل المبيد في فترة سقوط البتلات على أشجار الفاكهة.
- لا يستحب خلط المبيد في تنك الرش مع كل من المبيدات التالية: زيوت الرش بالإضافة إلى الكابتان والكبريت.
- لا يستعمل المبيد في البيوت الزجاجية أو البيوت البلاستيكية.
- يجب البدء برش المبيد عند بداية ظهور الآفات وقبل زيادة أعدادها.

فترات تحرير دخول الحقل المرشوش :

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على آخر معاملة رش .

قابلية الخلط :

قابل للخلط مع معظم المبيدات المعروفة، إلا أنه ينصح بإجراء تجربة خلط مصفرة على نطاق ضيق قبل الخلط مع أي مبيد للمرة الأولى.

* للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.